ÖGGH
20WELS25

58. Jahrestagung & 35. Fortbildungskurs & 3. „Pre“-Symposium ^{young} ÖGGH

11. Juni 2025 – „Pre“-Symposium *young* ÖGGH
12. Juni 2025 – Fortbildungskurs
13.–14. Juni 2025 – Jahrestagung
Messe Wels

Programm

Kongresspräsident:
Harald Hofer

Wissenschaftliches Komitee:
Patrick Dinkhauser
Hans-Peter Gröchenig
Stephanie Hametner-Schreil
Mattias Mandorfer
Philipp Schreiner

young ÖGGH:
Jasmin Zessner-Spitzenberg
Johannes Haunschmidt
Florian Koutny
Aylin Sezer

Kongressbüro:
MAW – Kongressbüro ÖGGH
Freyung 6, 1010 Wien
oeggh.jahrestagung@media.co.at

www.oeggh.at

Goldsponsoren

abbvie

IPSEN
Innovation for patient care

Johnson&Johnson

Lilly
A MEDICINE COMPANY

Pfizer

Takeda

Silbersponsoren

Alnylam[®]
PHARMACEUTICALS

ALFASIGMA

Bristol Myers Squibb[®]

GILEAD
Creating Possible

Madrigal

MERZ
THERAPEUTICS
Better outcomes for more patients.

Unterstützer

AstraZeneca

Reinhard Di Lena GmbH
Exklusiver Partnerzent für Fujifilm Endoskopie & Zubehör

Roche

(Stand bei Drucklegung)

Druck: ROBIDRUCK, 1200 Wien – www.robidruck.co.at

Sponsoren	Umschlagseite 2
ÖGGH-Mitgliedschaft	2
Vorwort	3
Allgemeine Hinweise	5
„Pre“ Symposium <i>young</i> ÖGGH, Mittwoch, 11. Juni	8
Fortbildungskurs, Donnerstag, 12. Juni	12
Jahrestagung, Freitag, 13. Juni	17
Jahrestagung, Samstag, 14. Juni	22
Jahreshauptversammlung der ÖGGH	22
Posterausstellung	25
Vorsitzende und Referenten	57
IVEPA-Jahrestagung	64
Fachkurzinformationen	66

Jetzt Mitglied werden und Vorteile sichern!

Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Ich darf Sie herzlichst einladen, Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH) zu werden. Die ÖGGH verfolgt den gemeinnützigen Zweck die Wissenschaft auf dem Gebiet der Gastroenterologie und Hepatologie zu fördern und die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse für Patient:innen in Österreich nutzbar zu machen.

Mitglieder genießen zahlreiche Vorteile:

- kostenlose Teilnahme an der Jahrestagung und dem Fortbildungskurs und diversen ÖGGH Veranstaltungen
- ermäßigte Gebühren für Fortbildungskurse
- ermäßigte Gebühren für die Gastro-Update-Seminare in Mainz und Berlin
- Gratisabonnement der Zeitschrift für Gastroenterologie (Thieme)
- elektronische Ankündigungen zu fachspezifischen Veranstaltungen
- Teilnahme an zahlreichen Preis- und Stipendienausschreibungen
- ÖGGH/ESGE Doppelmitgliedschaft

Wer kann Mitglied werden?

Die Mitgliedschaft in der ÖGGH steht allen interessierten Ärzt:innen und medizinischem Fachpersonal offen: Ärzt:innen in Ausbildung und Ärzt:innen in Pension erhalten die Mitgliedschaft zu speziellen Konditionen.

- FachärztInnen/AllgemeinmedizinerInnen: EUR 100/Jahr
- Andere ÄrztInnen, nicht-ärztliche Berufsgruppen (WissenschaftlerInnen, Pflegepersonen, DiätologInnen, ...), PensionistInnen, ÄrztInnen in Ausbildung: EUR 50/Jahr
- Studierende und Ehrenmitglieder zahlen keine Beiträge

Den Mitgliedsantrag und weitere Details finden Sie unter www.oeggh.at.

Es würde mich sehr freuen, Sie bald als neues Mitglied unserer Gesellschaft begrüßen zu dürfen.

Mit besten Grüßen

Primarius Univ.-Prof. Dr. Harald Hofer
Präsident der ÖGGH

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen,

Zusammen mit meinem wissenschaftlichen Programmkomitee und der *young* ÖGGH lade ich Sie herzlich zur **ÖGGH-Jahrestagung 2025** nach Wels ein – dem Höhepunkt unseres gastroenterologisch-hepatologischen Fortbildungsjahres.

Wir haben ein spannendes und aktuelles Programm für Sie erarbeitet. Unter dem Motto „Gelungene Innovation wird zur Tradition“ startet es auch heuer bereits am Mittwoch mit dem von der *young* ÖGGH organisierten Pre-Symposium. Neben Fall-basierten Vorträgen zu hepatologischen Problemstellungen werden wieder Hands-on-Kurse angeboten. Der Tag endet mit einem Pubquiz – eine hervorragende Gelegenheit für junge Kolleg:innen, Wissen und Fertigkeiten zu vertiefen, Kontakte zu knüpfen und Kooperationen zu entwickeln.

Im Fortbildungskurs mit dem Thema „lege artis“ werden klinische Fragestellungen in verschiedenen Formaten wie State-of-the-Art-Vorträgen sowie Pro-&Contra- und Podiumsdiskussionen beleuchtet. Der Bogen spannt sich weit und bietet Relevantes sowie Kontroversielles für Ihre klinische Praxis.

Auch die Jahrestagung bringt Neuerungen: Die thematische Strukturierung der Sitzungen wurde erweitert. Topaktuelle Konsensus-Statements der ÖGGH zur Sedierung in der Endoskopie sowie zur Diagnostik und Therapie der MASLD werden vorgestellt. Somit werden Sie auf den absolut neuesten Stand der Empfehlungen gebracht! Am Freitagnachmittag findet erstmals eine gemeinsame Sitzung mit der IVEPA statt. Preise, die sonst in der „Stunde der Gesellschaft“ vergeben wurden, werden diesmal an geeigneter Stelle ins Hauptprogramm integriert oder im feierlichen Rahmen des Festabends verliehen, um die Leistungen junger Kolleg:innen in feierlichem Rahmen und auf einer größeren Bühne angemessen zu würdigen. Der Samstag wurde wieder auf medizinisch-gastroenterologische Themen ausgerichtet. Zudem gibt es eine Videosession zu komplexen endoskopischen Interventionen mit und ohne Komplikationen, präsentiert von jungen und erfahrenen Endoskopiker:innen, um die klinische Expertise zu fördern.

Während der gesamten Tagung haben wir versucht die Themen und Referent:innen der Symposien mit jenen des Hauptprogramms abzustimmen, mit dem Ziel Ihnen damit wertvolle Ergänzungen zu bieten. Für die Unterstützung und Kooperationsbereitschaft danken wir den Sponsoren herzlich.

Wir hoffen, unser Programm stößt auf Ihr Interesse und laden Sie herzlich nach Wels ein!

Ihr Harald Hofer

KEYTRUDA® in der gastrointestinalen Onkologie

Ösophaguskarzinom

beim lokal fortg. nicht resez./metas. **Ösophaguskarzinom mit PD-L1 CPS $\geq$ 10**, 1L, Kombi mit Platin- und Fluoropyrimidin-basierter Chemotherapie

1L

Magen-/GEJ-Karzinom

• beim lokal fortg. nicht resez./metas. **HER2-pos. Adenokarzinom des Magens** oder des **GEJ mit PD-L1 CPS $\geq$ 1**, 1L, Kombi mit Trastuzumab sowie Platin- und Fluoropyrimidin-basierter Chemotherapie

1L

• beim lokal fortg. nicht resez./metas. **HER2-neg. Adenokarzinom des Magens** oder des **GEJ mit PD-L1 CPS $\geq$ 1**, 1L, Kombi mit Platin- und Fluoropyrimidin-basierter Chemotherapie

1L

• beim nicht resez./metas. **Magenkarzinom mit MSI-H/dMMR** mit Fortschreiten der Erkrankung während/nach mind. 1 Vortherapie, Monotherapie

nach $\geq$ 1 Therapie

Biliäres Karzinom

• beim lokal fortg. nicht rezes./metas. **biliären Karzinom**, 1L, Kombi mit Gemcitabin und Cisplatin

1L

• beim nicht resez./metas. **biliären Karzinom mit MSI-H/dMMR**, mit Fortschreiten der Erkrankung während/nach mind. 1 Vortherapie, Monotherapie

nach $\geq$ 1 Therapie

Dünndarmkarzinom

beim nicht resez./metas. **Dünndarmkarzinom mit MSI-H/dMMR**, mit Fortschreiten der Erkrankung während/nach mind. 1 Vortherapie, Monotherapie

nach $\geq$ 1 Therapie

Kolorektalkarzinom (CRC)

• beim metas. **CRC mit MSI-H/dMMR**, 1L, Monotherapie

1L

• beim nicht resez./metas. **CRC mit MSI-H/dMMR** nach Fluoropyrimidin-basierter Kombinationstherapie, Monotherapie

nach Chemo-Kombi

1L = Erstlinie; CPS = combined positive score; dMMR = Mismatch-Reparatur-Defizienz; GEJ = gastroösophagealer Übergang; MSI-H = hochfrequente Mikrosatelliten-Instabilität; PD-L1 = programmierter Zelltod-Ligand 1

Vollständige Indikationen siehe Fachinformation.

Vor Verschreibung von KEYTRUDA® lesen Sie bitte die vollständige Fachinformation. Fachkurzinformation inkl. ausgewählter Sicherheitshinweise siehe Seite 66.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H
THE ICON VIENNA, Turm A, 20. Stock,
Wiedner Gürtel 9 – 13, 1100 Wien; www.msd.at

KEYTRUDA®
Pembrolizumab, MSD

Teilnahmegebühren / Anmeldung:

young ÖGGH – „Pre“ Symposium

Mittwoch, 11. Juni 2025

Mitglieder der ÖGGH	€ 30,-
Nichtmitglieder der ÖGGH	€ 50,-
Ärzt:innen in Ausbildung (mit Bestätigung)	€ 50,-
Student:innen (mit Ausweis)	€ 30,-

Fortbildungskurs

Donnerstag, 12. Juni 2025

Mitglieder der ÖGGH	kostenlos
Nichtmitglieder der ÖGGH	€ 180,-
Ärzt:innen in Ausbildung (mit Bestätigung)	€ 100,-
Pflegeberufe	€ 100,-
Student:innen (mit Ausweis)	kostenlos
Presse (mit Ausweis)	kostenlos

Jahrestagung

Freitag, 13. und Samstag 14. Juni 2025

Mitglieder der ÖGGH	kostenlos
Nichtmitglieder	€ 180,-
Ärzt:innen in Ausbildung (mit Bestätigung)	€ 100,-
Pflegeberufe	€ 50,-
Student:innen (mit Ausweis)	kostenlos
Presse (mit Ausweis)	kostenlos

Abendveranstaltungen – Anmeldung erforderlich:

Donnerstag – Begrüßungsabend (12. Juni 2025)	€ 30,- pro Person
Freitag – Festabend (13. Juni 2025)	€ 45,- pro Person

Registratur:

Ausschließlich online über folgenden Link möglich:

<https://registration.maw.co.at/oeggh2025>

Registratur – Öffnungszeiten:

Mittwoch, 11. Juni 2025	08.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag, 12. Juni 2025	08.00 – 18.00 Uhr
Freitag, 13. Juni 2025	08.00 – 17.30 Uhr
Samstag, 14. Juni 2025	07.30 – 13.00 Uhr

DFP

Diese Veranstaltung wird im Rahmen des Diplom-Fortbildungsprogrammes der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) für das Fach Innere Medizin/-Gastroenterologie & Hepatologie anerkannt. Die Teilnahmebestätigung mit den zugeteilten Punkten erhalten Sie vor Ort.

Tagungskonto:

Konto: ÖGGH Jahrestagung
Bank: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
BIC: RLNWATWW
IBAN: AT92 3200 0018 1209 8398

Tagungsort:

Messe Wels, Halle 21, Messeplatz 1, 4600 Wels

Veranstalter:

ÖGGH – Österreichische Gesellschaft für Gastroenterologie & Hepatologie
www.oeggh.at

Wissenschaftliche Leitung:

Kongresspräsident: Harald Hofer (Wels)

Wissenschaftliches Komitee: Patrick Dinkhauser (Wels)
Hans-Peter Gröchenig (St. Veit an der Glan)
Stephanie Hametner-Schreil (Linz)
Mattias Mandorfer (Wien)
Philipp Schreiner (Wien)

young ÖGGH: Jasmin Zessner-Spitzberger (Wien)
Johannes Haunschmidt (Wels)
Florian Koutny (St. Pölten)
Aylin Sezer (Wels)

Information / Anmeldung:

MAW – Kongressbüro ÖGGH
Freyung 6, 1010 Wien
E-Mail: oeggh.jahrestagung@media.co.at
Tel.: +43 1 536 63-36

Hotelreservierung:

Tourismusverband Region Wels
Buchungslink:
<https://www.wels.at/welsmarketing/tourismusregion/hotels.html>

Fachausstellung:

Medizinische Ausstellungs- und Werbegesellschaft
Engerthstraße 128, 1200 Wien
E-Mail: oeggh.jahrestagung@media.co.at
Tel.: +43 1 536 63-67 od. -42

31. IVEPA Jahrestagung 2025

Freitag, 13. Juni 2025 08.15 – 17.25 Uhr

Tagungsort:

Messe Wels, Halle 21, Messeplatz 1, 4600 Wels

Veranstalter:

Interessenverband Endoskopiepersonal Austria

Organisation:

Natascha Coti, DGKP

Thomas Sieber, DGKP

Teilnahmegebühr:

IVEPA Mitglied € 160,-

Nichtmitglied € 200,-

Anmeldung

über die Website: <https://www.ivepa.at/event>

Information:

Interessenverband Endoskopiepersonal Austria

Postfach 17, 1097 Wien, Österreich

eMail: office@ivepa.at

Abendveranstaltungen – Anmeldung erforderlich:

Donnerstag 12. Juni 2025: Begrüßungsabend € 30,-

Freitag 13. Juni 2025: Festabend € 45,-

Wir danken folgenden Firmen für die Unterstützung des
„Pre“-Symposiums der *young* ÖGGH

AstraZeneca

Johnson&Johnson

sanofi

Mittwoch, 11. Juni 2025

Die *young* ÖGGH freut sich, am 11.06.2025 zu folgender Fortbildungsveranstaltung einladen zu dürfen:

young ÖGGH „Pre“ Symposium 2025: Schwerpunkt: Hepatologie

Die *young* ÖGGH veranstaltet vor dem Hauptkongress einen Tag für alle Nachwuchs-Gastroenterolog:innen und Hepatolog:innen. Ob studierend oder kurz vor der Facharztprüfung – mit dem abwechslungsreichen Programm ist für jede:n etwas dabei. Am Vormittag finden Workshops in Kleingruppen statt (diese sind im Vorfeld zu buchen), am Nachmittag Fallbasierte Vorträge, die die Vorbereitung zur Facharztprüfung erleichtern sollen. Die Themenschwerpunkte wechseln jährlich (oberer & unterer Gastrointestinaltrakt, hepatologischer bzw. pankreatobiliärer Schwerpunkt).

Workshop-Programm:

Ab 9.00	Get together mit Kaffee und Frühstück
09.20	Willkommensworte durch den Präsidenten der ÖGGH
09.30 – 10.30	Hands-on Workshop in Kleingruppen
10.30 – 10.40	Kaffee-Pause
10.40 – 11.40	Hands-on Workshop in Kleingruppen
11.40 – 11.50	Kaffee-Pause
11.50 – 12.50	Hands-on Workshop in Kleingruppen
	Mittagspause
13.30 – 14.20	Hands-on Workshop Endoskopie
14.20 – 14.30	Kaffee-Pause
14.30 – 15.20	Hands-on Workshop Endoskopie
15.20 – 15.30	Kaffee-Pause
15.30 – 16.20	Hands-on Workshop Endoskopie

Folgende Workshops sind 2025 buchbar:

- 1) Endoskopie allgemein
- 2) Endoskopie spezial
- 3) Sonographie Leber Basic
- 4) Sonographie Leber Advanced
- 5) Leberbiopsie
- 6) Endoskopie Bilder Quiz

Es können max. 3 Workshops am Vormittag und 2 Endoskopie Workshops am Nachmittag gebucht werden. Es besteht eine begrenzte Teilnehmeranzahl. (max. Teilnehmerzahl 8 Personen)

Anmeldung bitte unter: <https://registration.maw.co.at/oeggh2025>

Mittwoch, 11. Juni 2025

Vortrags-Programm:

Ab 12.50 **Mittagspause**

13.30 – 16.30 **Interaktive Fall-basierte Vorträge**

13.30 – 14.20 Transaminasen erhöht, was nun?
Christoph Grander (Innsbruck)
Marlene Panzer (Innsbruck)

14.20 – 14.30 **Kaffee-Pause**

14.30 – 15.20 Interdisziplinäres Lebertumorboard –
Diagnose und Management
Mit freundlicher Unterstützung von
Bernhard Scheiner (Wien)
Katharina Pomej (Wien)
Katharina Lampichler (Wien)

AstraZeneca

15.20 – 15.30 **Kaffee-Pause**

15.30 – 16.20 Cholestatische & Immunologische
Lebererkrankungen
Mit freundlicher Unterstützung von
Peter Fickert (Graz)
Samy Mady (Graz)

16.20 – 16.30 *young* ÖGGH Ausbildungsinitiative –
How to Feedback & Evaluation
Julian Prosenz (St. Pölten)
Jasmin Zessner-Spitzenberg (Wien)

Ab 18.00 **Abendveranstaltung & Pubquiz der *young* ÖGGH**
Hansjörg Schlager (Graz)

GELBE BOX RE1¹

Eosinophile Ösophagitis (EoE):

DUPIXENT® – EINE PORTION MEHR LEBENSQUALITÄT^{2-4,*}

DUPIXENT® – DAS ERSTE UND EINZIG ZUGELASSENE BIOLOGIKUM, DAS ZIELGERICHTET AUF DIE URSACHE DER EOE WIRKT²⁻⁹

DYSPHAGIE BIS ZU **81%** VERBESSERUNG^{4,a}

HISTOLOGIE REMISSION BEI BIS ZU **100%** DER PATIENTEN^{4,b}

ENDOSKOPIE BIS ZU **85%** VERBESSERUNG^{4,c}

GELBE
BOX
RE1¹

* DUPIXENT® ist angezeigt zur Behandlung der Eosinophilen Ösophagitis bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 1 Jahr mit einem Körpergewicht von mindestens 15 kg, die mit einer konventionellen medikamentösen Therapie unzureichend therapiert sind, diese nicht vertragen oder für die eine solche Therapie nicht in Betracht kommt.²

a 81% reduction in dysphagia at week 52; 81% reduction in patients who received DUPIXENT® from baseline (n=54), and 78% reduction in patients who switched to DUPIXENT® from placebo at week 24 (n=24) (Part B/C); 70% reduction in dysphagia with DUPIXENT® at Week 24 (n=74) vs 48% with placebo (n=37) (P<0.0001). **b** 100% of patients achieved histological response (<15 EOS / HPP) at week 52; 100% of patients who received DUPIXENT® from baseline achieved histological response (<15 EOS/HPP) (n=65), and 78% of patients who switched to DUPIXENT® from placebo at Week 24 achieved histological response (n=29) (Part B/C). Up to 85% of patients achieved histological remission (≤6 EOS/HPP) at week 52; 85% of patients who received DUPIXENT® from baseline achieved histological remission (≤6 EOS/HPP) at Week 52 (n=55), and 68% of patients who switched to DUPIXENT® from placebo at Week 24 achieved histological remission (n=25) (PART B/C). **c** up to 85% improvement in endoscopic features (EREFs) at Week 52; 78% reduction in patients who received DUPIXENT® from baseline (n=63), and 85% reduction in patients who switched to DUPIXENT® from placebo at Week 24 (n=37) (Part B/C).

1. Erstattungskodex der österreichischen Sozialversicherung, Stand September 2024; 2. DUPIXENT® Fachinformation, Stand November 2024; 3. Dellon ES et al. N Engl J Med 2022; 387(25): 2317–330; inkl. Supplementary Material 4. Rothenberg ME, Dellon ES, Collins MH, et al. Efficacy and safety of dupilumab up to 52 weeks in adults and adolescents with eosinophilic oesophagitis (LIBERTY EoE TREET study): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. Published online August 31, 2023. doi:10.1016/S2468-1253(23)00204-2; 5. O'Shea KM et al. Gastroenterology 2018; 154(2): 333–45; 6. Chehade M et al. Gastro Hep Advances 2022; 1: 720–732; 7. Racca F et al. Front Physiol 2022; 12: 815842; 8. Greuter T et al. J Allergy Clin Immunol 2020; 145(1): 38–5; 9. Mielhke S et al. Z Gastroenterol 2018; 56(2): 139–50.

EOS/HPP = eosinophils per high-power field; EREFS = Endoscopic Reference Score.

Sanofi-Aventis GmbH Österreich, Turn A, 29. OG, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien, Tel: 01/801 85-0, www.sanofi.at

MAT-AT-2301043 – 3.0 – 11/2024 Fachkurzinformation siehe Seite 68

DUPIXENT®
(Dupilumab)

Zielgerichtet gegen Typ 2
inflammatorische Erkrankungen

sanofi | REGENERON®

Donnerstag, 12. Juni 2025

35. ÖGGH Fortbildungskurs „Lege artis“

09:00 – 09:05 **Begrüßung Mattias Mandorfer (Wien)**

09:05 – 10:20 **Dos & Don'ts**

Vorsitz: Peter Fickert (Graz)
Wolfgang Miehsler (Salzburg)

- Atemtests & Alternativen
Johann Hammer (Wien)
Hansjörg Schlager (Graz)
- Leberbiopsie im Zeitalter der nicht-invasiven Tests
Carolyn Lackner (Graz)
Georg Semmler (Wien)
- Wann & wieviel Albumin?
Vanessa Stadlbauer-Köllner (Graz)
Elisabeth Tatscher (Graz)

10:20 – 10:45 **Pause & Industrieausstellung**

10:45 – 12:00 **Fehler & wie vermeiden**

Vorsitz: Stephanie Hametner-Schreil (Linz)
Michael Gschwantler (Wien)

- Können in der Gastroenterologie und Hepatologie Aufklärungsgespräche durch Video- oder Telefonkonferenzen als „lege artis“ beurteilt werden?
Gerhard W. Huber (Linz)
- H. pylori
Christian Schulz (München)
- Coloskopie bei CED
Christoph Högenauer (Graz)

Donnerstag, 12. Juni 2025

12:00 – 12:40

Satellitensymposium – Abbvie Frühe Intervention mit Advanced Therapies: Ein Paradigmenwechsel in der Behandlung

Vorsitz: Peter Piringer (Linz)

- Erkenntnisse aus der PROFILE-Studie und den IBD Podcast-Daten
Peter Piringer (Linz)
- „IUST Do It – Ergebnisse aus der EUROPE-Studie“
Philipp Schreiner (Wien)
- Entscheidungsparameter und entsprechende KON(SEQUENCE)EN
Patrizia Constantini-Kump (Graz)

12:45 – 13:05

Satellitensymposium – Gilead Primär biliäre Cholangitis: Fortschritte mit neuen Therapieoptionen

Vorsitz: Peter Fickert (Graz)

- Diagnosestellung, Erstlinientherapie und wann auf Zweitlinientherapie eskalieren
Albert Stättermayer (Wien)
- Innovationen und Perspektiven der PBC-Therapie
Elisabeth Tatscher (Graz)

GILEAD
Creating Possible

13:05 – 13:25

Satellitensymposium – Merz L-Ornithin-L-Aspartat – mehr als nur Ammoniak-Senkung bei Leberzirrhose

Vorsitz: Thomas Reiberger (Wien)

Sprecherin: Vanessa Stadlbauer-Köllner (Graz)

MERZ
THERAPEUTICS
Better outcomes for more patients.

Donnerstag, 12. Juni 2025

13:30 – 14:15 **Evidenzbasierte Medizin & klinische Praxis**

Vorsitz: Markus Peck-Radosavljevic (Klagenfurt)
Stephanie Hametner-Schreil (Linz)

- Wie entstehen & was bedeuten Empfehlungen
Benedikt Schäfer (Innsbruck)
- Lege artis vs. klinische Realität: Präemptiver TIPS
Lukas Hartl (Wien)
- Podiumsdiskussion

14:15 – 14:55

Satellitensymposium – Lilly **Nicht er-/bekannte Symptome** **bei Morbus Crohn und neue Wege der** **Therapie – Ein Expert:innen Austausch**

Robert Koch (Innsbruck)
Sonja Heeren (Salzburg)
Reingard Platzer (Wr. Neustadt)

14:55 – 15:30 **Pause & Industrieausstellung**

15:30 – 16:15 **Near Miss**

Vorsitz: Rainer Schöfl (ehemals Linz)
Barbara Tribl (Wien)

- Fremdkörper
Philipp Pimingstorfer (Linz)
- Gastrointestinale Perforationen
Alexander Ziachehabi (Linz)
- Drug-Induced Liver Injury
Elmar Aigner (Salzburg)

Jetzt zugelassen

DIE ERSTE ORALE INNOVATION FÜR MEHR RUHE IM DARM BEI CU AB 16 JAHREN^{1,§}

STARK

- 100 % der Patient*innen in klinischer Remission waren zu Woche 52 steroidfrei^{1,#}
- Schnelle Symptomverbesserung bereits ab Tag 2²
- Nachgewiesene Wirksamkeit bei isolierter Proktitis³

GUTE VERTRÄGLICHKEIT

- Infektionsrate auf Placebo-Niveau^{1,§}

ORAL

- 1x täglich - keine Dosistitration notwendig¹

Velsipity[®]
(etrasimod) ^{2mg}
Tabletten

1 x täglich²

Die häufigsten Nebenwirkungen sind Lymphopenie (11 %) und Kopfschmerzen (7 %).

§ Bei Patient*innen mit mittelschwerer bis schwerer aktiver CU, die auf eine konventionelle Therapie oder ein Biologikum unzureichend oder gar nicht angesprochen haben oder diese nicht vertragen. **#** zu Woche 52 waren 32 % der Patient*innen in Remission (vs. 7 % Placebo); klinische Remission definiert als SF-Subscore = 0 (oder = 1 mit einem Rückgang von ≥ 1 Punkt gegenüber dem Ausgangswert), RB-Subscore = 0 und ES ≤ 1 (ausgenommen Kontaktvulnerabilität); steroidfrei war definiert als klinische Remission zu Woche 52 ohne Kortikosteroidgabe für ≥ 12 Wochen unmittelbar vor Woche 52. **§** Gesamthäufigkeit an Infektionen auf Placeboniveau, niedrige Raten von unerwünschten Ereignissen von besonderem Interesse; Etrasimod erhöhte das Risiko für Infektionen der Harnwege und Infektionen der unteren Atemwege.

CU: Colitis ulcerosa; **ES:** endoskopischer Subscore; **RB:** Rektalblutung; **SF:** Stuhlfrequenz.

Literatur: **1.** Velsipity Fachinformation, aktueller Stand. **2.** Dubinsky MC et al. The American Journal of Gastroenterology 118(10S);p S623. https://journals.lww.com/ajg/fulltext/2023/10001/s843_symptomatic_improvement_observed_within_2.1382.aspx (Letzter Download 07.24).

3. Peyrin-Biroulet L et al. J Crohns Colitis. 2024 Apr 13;jjae038. Epub ahead of print

© Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H., Wien
www.pfizer.at www.pfizermed.at

PP-V1A-AUT-0021/07.2024

Fachkurzinformation siehe Seite 67

Donnerstag, 12. Juni 2025

16:15 – 17:15 **Practice Changing: Neue Empfehlungen 2025**

Vorsitz: Harald Hofer (Wels)
Emina Halilbasic (Wien)

- Gastroenterologie
Hans Peter Gröchenig (St. Veit an der Glan)
- Endoskopie
Monika Ferlitsch (Wien)
- Hepatologie
Mattias Mandorfer (Wien)

17:15 – 18:00 **Satellitensymposium – Pfizer** **Orale Therapien bei Colitis ulcerosa:** **Neue Ansätze im Einklang mit** **Patientenwünschen**

Vorsitz: Christoph Högenauer (Graz)

- Impulsvortrag: Tablette vs. Spritze –
Ist das eine immer besser?
Christoph Högenauer (Graz)
- Updates aus der Gruppe der JAK-Inhibitoren
Christoph Högenauer (Graz)
- Velsipity® (Etrasimod) – eine neue orale Option
Sonja Heeren (Salzburg)

19:00 **Begrüßungsabend**

Freitag, 13. Juni 2025

08.30 – 08.35 Begrüßung

08.35 – 10.00 **Sitzung 1: GI-Onkologie**

Vorsitz: Markus Peck-Radosavljevic (Klagenfurt)
Peter Fickert (Graz)

- Update zur HCC Therapie
Matthias Pinter (Wien)
- Pankreasraumforderung
Andreas Maieron (St. Pölten)
- Freier Vortrag
Circulating antibody score identifies patients with HCC with a favourable outcome following immunotherapy
Bernhard Scheiner (Wien)
- Lebertransplantation im Rahmen onkologischer Behandlungskonzepte gastrointestinaler Tumore
Benedikt Schäfer (Innsbruck)

10.00 – 10.30 **Pause & Industrieausstellung**

10.30 – 11.30 **Sitzung 2: ÖGGH-Konsensus & Leitlinien**

Vorsitz: Michael Trauner (Wien)
Herbert Tilg (Innsbruck)

- ÖGGH/ÖDG/ÖAG Konsens zur MASLD/MASH
Mattias Mandorfer (Wien)
Georg Semmler (Wien)
- Freier Vortrag
Effektivität einer Low-Carb Formuladiät in PatientInnen mit MASLD
Thomas-Matthias Scherzer (Wr. Neustadt)
- ÖGGH-Konsens zur Eosinophilen Ösophagitis
Philipp Schreiner (Wien)

11.30 – 12.00 **Pause & Industrieausstellung**

Freitag, 13. Juni 2025

12.00 – 12.40 **Satellitensymposium – Johnson & Johnson**
From Skin to Within:

**Dermatologische Erfahrung trifft auf
gastroenterologischen Anspruch**

Vorsitz: Walter Reinisch (Wien)

Sprecher: Leo Richter (Wien)

Alexander Eser (Wien)

Johnson & Johnson

12.40 – 13.20 **Satellitensymposium – Takeda**
**Labyrinth Kurzdarmsyndrom –
ein Leitfaden**

Vorsitz: Christian Datz

Sprecherin: Stefanie Dabsch (Wien)

➤ Podiumsdiskussion:

Stefanie Dabsch (Wien)

Christian Datz (Oberndorf)

Claudius Falch (Bregenz)

12.00 – 13.20 **Posterausstellung und Preisverleihung:**
Poster und Eisai Young Investigator Programm 2025

Vorsitz Hepatologie 1: Michael Gschwantler (Wien)
Christoph Grander (Innsbruck)

Vorsitz Hepatologie 2: Thomas Reiberger (Wien)
Thomas-Matthias Scherzer
(Wr. Neustadt)

Vorsitz Beste Abschlussarbeit,
Gastroenterologie, CED: Andreas Blesl (Graz)
Lili Kazemi-Shirazi (Wien)

Vorsitz Endoskopie: Stefanie Dabsch (Wien)
Werner Dolak (Wien)

Freitag, 13. Juni 2025

13.20 – 14.00 **Pause & Industrieausstellung**

14.00 – 15.45 **Sitzung 3: Gemeinsame Sitzung mit IVEPA**

Vorsitz: Michael Häfner (Wien)

Andreas Maieron (St. Pölten)

- Preisverleihung: Endoskopiediplom und Nachwuchs-Endoskopiker:innen 2025
- ÖGGH-Positionspapier: Sedierung bei gastrointestinalen Endoskopien
Christian Madl (Wien)
- Endoskopischer Verschluss nach EMR, ESD:
Wann? Wie?
Werner Dolak (Wien)
- Endoskopie 2030 – aus Sicht des Endoskopikers & aus Sicht der Endoskopieassistentz
Andreas Püspök (Eisenstadt)
Martina Fellinghauer (Wien)
- Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Rainer Schöfl
Laudatio: Alexander Ziachehabi (Linz)
Arnulf Ferlitsch (Wien)

15.45 – 16.15 **Pause & Industrieausstellung**

16.15 – 16.35 **Satellitensymposium – Alnylam
Chronische Bauchschmerzen –
auch an die Zebras denken!**

Vorsitz: Elisabeth Tatscher (Graz)

Sprecherin: Vanessa Stadlbauer-Köllner (Graz)

16.35 – 16.55 **Satellitensymposium – BMS
Hepatozelluläres Karzinom: Neue
Horizonte und Perspektiven**

Vorsitz: Andreas Maieron (St. Pölten)

Sprecher: Matthias Pinter (Wien)

Erster präferenzzieller und einziger
erstatteter JAK1-Inhibitor für CU^{#,1}

Gemeinsam den Weg für Colitis ulcerosa Patient:innen erleichtern

**RE2
HELLGELB**

1st LINE
nach
konventionellen
Therapien^{#1}

Jyseleca[®]
filgotinib

Rasch

Linderung der Symptome bereits
nach wenigen Tagen^{2,a}

Anhaltend

Klinische Remission und klinisch bedeutsame
Verbesserung der Lebensqualität **über 5 Jahre**^{3,b}

Einfach

1x täglich, 1 Tablette, mit überzeugendem
Sicherheitsprofil **über 5 Jahre**^{*1,3,4}

CU, Colitis ulcerosa, **pMCS**, partial Mayo Clinic Score.

Erstattungskodex des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungen: <http://www.erstattungskodex.at>

* Geringe Raten an mit JAK-Inhibitoren assoziierten Nebenwirkungen: Schwerwiegende Infektionen, Herpes Zoster, schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse (MACE), venöse Thromboembolien (VTE). Die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen sind Übelkeit (3,5 %), Infektion der oberen Atemwege (3,3 %), Infektion des Harntrakts (1,7 %), Schwindelgefühl (1,2 %) und Lymphopenie (1,0 %).

a Filgotinib 200 mg verbesserte im Vergleich zu Placebo die rektalen Blutungen und die Stuhlhäufigkeit innerhalb von 7 Tagen (P < 0.05).

b Klinische Remission definiert als pMCS ≤ 1. pMCS wurde definiert als die Summe der Mayo Subscores für rektale Blutungen, Stuhlhäufigkeit und Gesamtbewertungen durch die Ärztin/den Arzt. Klinisch bedeutsame Verbesserung der Lebensqualität wurde definiert als IBD-Questionnaire Score ≥ 16 Punkte Anstieg gegenüber dem Ausgangswert.

Referenzen: **1** JYSELECA[®] Fachinformation. Stand 10/2024. **2** Danese S et al. Am J Gastroenterol. 2023 Jan 1;118(1):138-147. doi: 10.14309/ajg.0000000000001979. Epub 2022 Aug 23. PMID: 36113491; PMCID: PMC9810009. **3** Feagan B, et al. UEG Week October 2024. Oral presentation: OP105. **4** Schreiber S et al. Aliment Pharmacol Ther. 2023 Nov;58(9):874-887. doi: 10.1111/apt.17674. Epub 2023 Sep 18. Erratum in: Aliment Pharmacol Ther. 2023 Dec 3; PMID: 37718932.

Hier finden Sie
die Kurzfassung der
Fachinformation.

Alfasigma Austria GmbH
Herrengasse 1-3 • 1010 Wien

AT-UC-JY-202501-00004, Erstellt: Jänner 2025

ALFASIGMA

Freitag, 13. Juni 2025

16.55 – 17.15

Satellitensymposium – Alfasigma Code R.E.D. in der CU

Vorsitz: Patrizia Constantini-Kump (Graz)

*Sprecher:in: Patrizia Constantini-Kump (Graz)
Christian Primas (Wien)*

ALFASIGMA

19.30 Uhr

Festabend mit Preisverleihung: Wewalkapreis, Dr. Falk Preis, Wissenschaftsförderung und Dr. Falk Förderung für Jungwissenschaftler:innen 2025

Samstag, 14. Juni 2025

07.30 – 08.30 **Jahreshauptversammlung**

08.30 – 09.30 **Sitzung 4: Kombinationstherapien:
Wie geht man es 2025 an?**

Vorsitz: Clemens Dejaco (Wien)
Walter Reinisch (Wien)

- Preisverleihung:
CED Preis 2025
- Biologikakombinationen bei CED:
Wer? Wie? Wann? Wie lange?
Andreas Blesl (Graz)
- Freier Vortrag
RXRA in Paneth cells as driver of
intestinal inflammation
Moritz Meyer (Innsbruck)
- Probiotika als Add-on-Kombination
Christoph Högenauer (Graz)

09.30 – 10.10 **Satellitensymposium – Ipsen
Seltene cholestatische
Lebererkrankungen im Spotlight**

Vorsitz: Elmar Aigner (Salzburg)

- 9 Monate IQIRVO – Updates und
Erfahrungen aus der Praxis
Vanessa Stadlbauer-Köllner (Graz)
- Fokus Diagnose – Wann an genetische Ursachen
denken?
Emina Halilbasic (Wien)

Samstag, 14. Juni 2025

10.10 – 10.30 **Satellitensymposium – Madrigal
Diagnose und Risikostratifizierung der
Leberfibrose bei MASH**

Vorsitz: Harald Hofer (Wels)

Sprecher: Michael Trauner (Wien)

10.30 – 11.00 **Pause & Industrieausstellung**

11.00 – 12.00 **Sitzung 5: Endoskopie Video Session:
Pearls and Pitfalls**

Vorsitz: Maximilian Schöniger-Hekele (Wien)
Michael Häfner (Wien)

- Papillektomie
Johannes Haunschmidt (Wels)
Patrick Dinkhauser (Wels)
- EUS gezielte Drainage
Clara Meierhofer (Linz)
Alexander Ziachehabi (Linz)
- ESD/POEM
Rafael Paternostro (Wien)
Werner Dolak (Wien)

Samstag, 14. Juni 2025

12.00 – 13.00 **Sitzung 6: Infektionen in der Gastroenterologie**

Vorsitz: Christian Datz (Oberndorf)
Elmar Aigner (Salzburg)

- Patientenvignette 1:
Karin Steidl (St. Veit an der Glan)
- Infektionen bei CED
Pius Steiner (Wels)
- Patientenvignette 2:
Bernhard Wernly (Salzburg)
- Infektionen bei Zirrhose
Thomas Reiberger (Wien)

13.00

Verabschiedung

Harald Hofer (Wels)

Würstelessen

Posterausstellung

1. Beste Abschlussarbeit

P1 – Immunmedierte Ösophagopathien: histopathologische Remission der eosinophilen Ösophagitis unter topischer Kortikosteroidtherapie - Eine retrospektive Datenanalyse an einer Ösophagus Spezialambulanz an der Universitätsklinik für Innere Medizin (UKIM)

Brand G¹, Plank J², Schlager H²

¹Medizinische Universität Graz, Graz, Austria; ²Medizinische Universität Graz, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Graz, Austria

P2 – Therapy of Achalasia – A Retrospective Data Analysis at an Esophagus Specialty Outpatient Clinic

Staszewski A¹, Blesl A², Baumann-Durchschein F²

¹Medizinische Universität Graz, Graz, Austria; ²Medizinische Universität Graz, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Graz, Austria

2. Gastroenterologie

P3 – Association Between PPI-Therapy and Diverticulosis: A Cross-Sectional Analysis

Völkerer A¹, Wernly S¹, Semmler G², Flamm M³, Ausserwinkler M^{4,5}, Koch G¹, Götz N⁶, Hofer H¹, Aigner E⁵, Datz C¹, Wernly B^{5,3}

¹KH Oberndorf, Abteilung für Innere Medizin, Oberndorf, Austria;

²Universitätsklinikum Wien, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ³Paracelsus Medizinische Universität,

Institut für Allgemein-, Familien- und Präventivmedizin, Salzburg,

Austria; ⁴Elisabethinenkrankenhaus Klagenfurt, Abteilung für Innere

Medizin, Klagenfurt, Austria; ⁵Universitätsklinikum Salzburg, Abteilung

für Innere Medizin I, Salzburg, Austria; ⁶KH St. Vinzenz Zams,

Abteilung für Innere Medizin, Zams, Austria

Posterausstellung

P4 – Association Between Diabetes Mellitus and Diverticulosis: A Cross-Sectional Analysis

Völkerer A¹, Wernly S¹, Semmler G², Flamm M³, Ausserwinkler M^{4,5}, Koch G¹, Götz N⁶, Hofer H¹, Aigner E⁵, Datz C¹, Wernly B^{5,3}

¹KH Oberndorf, Abteilung für Innere Medizin, Oberndorf, Austria;

²Universitätsklinikum Wien, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria;

³Paracelsus Medizinische Universität, Institut für Allgemein-, Familien- und Präventivmedizin, Salzburg, Austria;

⁴Elisabethinenkrankenhaus Klagenfurt, Abteilung für Innere Medizin, Klagenfurt, Austria;

⁵Universitätsklinikum Salzburg, Abteilung für Innere Medizin I, Salzburg, Austria;

⁶KH St. Vinzenz Zams, Abteilung für Innere Medizin, Zams, Austria

P5 – Wöchentliche Falldiskussionen: Clinical Reasoning in der Inneren Medizin

Mady S¹, Maurer J^{2,3}, Bischof L⁴

¹Medizinische Universität Graz, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Graz, Austria;

²Klinik Landstraße, 4. Medizinische Abteilung mit Zentrum für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria;

³Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria;

⁴Medizinische Universität Graz, Klinische Abteilung für Rheumatologie und Immunologie, Graz, Austria

P6 – Accounting for comorbidity improves prediction of outcome trajectories in biliary acute pancreatitis

Prosenz J^{1,2,3}, Birkl M^{1,2}, Hadrigan T^{1,4}, Brandl L¹, Wittmann A¹, Koutny F^{1,2,3}, Maieron A^{1,2,3}

¹Karl Landsteiner University of Health Sciences, Krems, Austria;

²University Hospital St. Pölten, Department of Internal Medicine 2 Gastroenterology & Hepatology, St. Pölten, Austria;

³Paracelsus Medical University, Medical Science Research Program, Salzburg, Austria;

⁴University Hospital Tulln, Tulln an der Donau, Austria

Posterausstellung

P7 – Severity and mortality of acute pancreatitis in Austria – a retrospective study.

Hadrihan T^{1,2}, Brandl L¹, Wittmann A¹, Birkl M^{1,3}, Koutny F^{1,3,4},
Maieron A^{1,3,4}, Prosenz J^{1,3,4}

¹Karl Landsteiner University of Health Sciences, Krems, Austria;

²University Hospital Tulln, Tulln an der Donau, Austria; ³University Hospital St. Pölten, Department of Internal Medicine 2

Gastroenterology & Hepatology, St. Pölten, Austria; ⁴Paracelsus Medical University, Medical Science Research Program, Salzburg, Austria

P8 – Pankreatikokolische Fisteln - eine seltene Ursache protrahierter Diarrhö

Mady S¹, Högenauer C¹

¹Medizinische Universität Graz, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Graz, Austria

P9 – Klinisches Spektrum des Familiären Chylomikronämiesyndroms in einer Hochprävalenzpopulation – eine seltene Ursache der Splenomegalie und rezidivierenden Pankreatitis

Strebingner G¹, Jabbour J², Reich D¹, Amberger D¹, Kedenko L¹, Mörwald K², Schneider A², Heath O², Paulweber B¹, Weghuber D², Aigner E¹

¹UK f. Innere Medizin I, Salzburg, Austria; ²UK f. Kinder- und Jugendheilkunde, Salzburg, Austria

P10 – Impact of ESGE-Guideline Adherence on Infection Rates After PEG Placement: A Retrospective Cohort Study

Zottl J^{1,2}, Haller F^{1,2}, Pern V¹, Oschmautz AH¹, Koutny F^{1,2,3},
Maieron A^{1,2,3}, Prosenz J^{1,2,3}

¹Karl Landsteiner University of Health Sciences, Krems, Austria;

²University Hospital St. Pölten, Department of Internal Medicine 2 Gastroenterology & Hepatology, St. Pölten, Austria; ³Paracelsus

Medical University, Medical Science Research Program, Salzburg, Austria

Posterausstellung

P11 – Machine learning to predict early mortality after PEG implantation

**Haller F^{1,2}, Zottl J^{1,2}, Oschmautz AH¹, Pern V¹, Koutny F^{1,2,3},
Maieron A^{1,2,3}, Prosenz J^{1,2,3}**

¹Karl Landsteiner University of Health Sciences, Krems, Austria;
²University Hospital St. Pölten, Department of Internal Medicine 2
Gastroenterology & Hepatology, St. Pölten, Austria; ³Paracelsus
Medical University, Medical Science Research Program, Salzburg,
Austria

P12 – Clinical utility and quality of newly introduced contrast-enhanced ultrasound (CEUS) at a tertiary center for gastroenterology & hepatology – results from a single-center registry

Venturi D^{1,2}, Koutny F^{1,2,3}, Gabriel L^{2,1}, Maieron A^{1,2,3}, Prosenz J^{2,1,3}

¹Karl Landsteiner Universität, Krems, Austria; ²Universitätsklinikum
St. Pölten, Abteilung für Innere Medizin 2 Gastroenterologie und
Hepatologie, St. Pölten, Austria; ³Paracelsus Medical University,
Medical Science Research Program, Salzburg, Austria

P13 – Prevalence of dysphagia and eosinophilic esophagitis in patients with inflammatory bowel disease or type 2 inflammation – interim analysis of a prospective, multicentric screening study

**Bäuerle M¹, Maurer J¹, Novacek G¹, Primas C¹, Kazemi-Shirazi L¹,
Dabsch S¹, Frick A¹, Pokryszka J¹, Reinisch W¹, Dejaco C¹, Trauner M¹,
Stoshikj S¹, Bangert C¹, Schneider S¹, Wöhrl S², Schreiner P¹**

¹Medizinische Universität Wien, Wien, Austria; ²Floridsdorfer
Allergiezentrum, Wien, Austria

P14 – Carboception®: Selbstdiagnose und Therapieanpassung bei Kohlenhydratintoleranzen mittels CE-zertifizierter App

Hammer J¹, Hammer H²

¹Medizinische Universität Wien, Wien, Austria; ²Medizinische
Universität Graz, Graz, Austria

Posterausstellung

P15 – Treatment patterns of eosinophilic esophagitis in the biologic era – an Austrian real-world analysis

Pokryszka J¹, **Weitersberger M**², **Dinkhauser P**³, **Steidl K**⁴, **Horvatits T**⁵, **Häfner M**⁶, **Kazemi-Shirazi L**¹, **Novacek G**¹, **Trauner M**¹, **Sieghart W**⁷, **Schlager H**⁸, **Schreiner P**¹

¹Medizinische Universität Wien, Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ²Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwester, Gastroenterologie und Hepatologi, Linz, Austria; ³Klinikum Wels-Grieskirchen, Gastroenterologie und Hepaologie, Wels-Grieskirchen, Austria; ⁴Barmherzige Brüder St. Veit, Gastroenterologie und Hepatologie, St. Veit an der Glan, Austria; ⁵Gastromedics, Gastroenterologie, Eisenstadt, Austria; ⁶Klinikum Barmherzige Schwestern Wien, Innere Medizin 2, Wien, Austria; ⁷Imed 19, Gastroenterologie, Wien, Austria; ⁸Medizinische Universität Graz, Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria

3. Hepatologie

P16 – The association of ferritin with subclinical coronary artery calcification is an expression of underlying cardiometabolic risk

Genluckner S¹, **Wernly B**², **Eberhardt J**³, **Ausserwinkler M**⁴, **Koutny F**⁵, **Zandanell S**², **Paulweber B**⁶, **Iglseder B**⁷, **Trinka E**⁸, **Frey V**⁸, **Langthaler P**⁸, **Datz C**⁹, **Aigner E**²

¹Universitätsklinikum Salzburg, Universitätsklinik für Innere Medizin 1, Salzburg, Austria; ²Universitätsklinikum Salzburg, Universitätsklinik für Innere Medizin 1, Salzburg, Austria; ³Universitätsklinikum Salzburg, Universitätsklinik für Innere Medizin 1, Salzburg, Austria; ⁴Elisabethinen-Krankenhaus, Abteilung für Innere Medizin, Klagenfurt, Austria; ⁵Universitätsklinik St. Pölten, Abteilung für Innere Medizin 2, St. Pölten, Austria; ⁶Universitätsklinikum Salzburg, Salzburg, Austria; ⁷Universitätsklinikum Salzburg, Abteilung für Geriatrie, Salzburg, Austria; ⁸Universitätsklinikum Salzburg, Abteilung für Neurologie, Salzburg, Austria; ⁹Krankenhaus Oberndorf, Abteilung für Innere Medizin, Oberndorf, Austria

Posterausstellung

P17 – Veränderungen im VITRO-Score als prognostischer Marker für Mortalität und portale Hypertension nach Lebertransplantation

Dominik N^{1,2,3}, Dinjar Kujundzic P⁴, Kristandl F¹, Balcar L^{1,2,3}, Hartl L^{1,2,3}, Sebesta C^{1,2,3}, Kramer G^{1,2,3}, Thöne P^{1,2,3}, Mandorfer M^{1,2,3}, Trauner M^{1,3}, Berlakovich G⁵, Reiberger T^{1,2,3}

¹Medizinische Universität Wien, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ²Medizinische Universität Wien, Vienna Hepatic Hemodynamic Lab, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ³Medizinische Universität Wien, LBG Klinische Forschungsgruppe MOTION, Wien, Austria;

⁴Universitätsklinikum Merkur, Medizinische Fakultät, Universität Zagreb, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Zagreb, Croatia; ⁵Medizinische Universität Wien, Abteilung für Transplantation, Universitätsklinik für Chirurgie, Wien, Austria

P18 – MASLD und koronare Kalzifizierung: Robuste Evidenz durch bayesianische Analysen.

Koutny F^{1,2,3}, Frey V^{4,5}, Datz C⁶, Gensluckner S^{3,7}, Prosenz J^{1,2,3}, Langthaler P⁴, Maieron A^{1,2,3}, Flamm M^{8,9}, Weghuber D¹⁰, Iglseder B¹¹, Trinkla E^{4,12}, Paulweber B⁷, Aigner E⁷, Wernly B^{7,8}

¹Karl Landsteiner Universität für Gesundheitswissenschaften, Krems, Austria; ²Universitätsklinikum St. Pölten, Abteilung für Innere Medizin 2 Gastroenterologie & Hepatologie, St.Pölten, Austria; ³Paracelsus Medizinische Universität, Medical Science Research Program, Salzburg, Austria; ⁴Christian-Doppler-Klinik, Abteilung für Neurologie, Salzburg, Austria; ⁵Christian-Doppler-Universitätsklinikum, Neuroscience Institut, Salzburg, Austria; ⁶Allgemeines Krankenhaus Oberndorf, Abteilung für Innere Medizin, Salzburg, Austria;

⁷Universitätsklinikum Salzburg, Universitätsklinik für Innere Medizin 1, Salzburg, Austria; ⁸Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg, Zentrum für Public Health und Gesundheitsforschung, Salzburg, Austria; ⁹Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Institut für Allgemeinmedizin, Familienmedizin und Präventivmedizin, Salzburg, Austria; ¹⁰Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Forschungsprogramm für Medizinwissenschaften, Salzburg, Austria;

Posterausstellung

¹¹Christian-Doppler-Klinik, Abteilung für Geriatriische Medizin, Salzburg, Austria; ¹²UMIT – Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik, Abteilung für Public Health, Versorgungsforschung und Health Technology Assessment, Tirol, Austria

P19 – hepatomiR als potenzieller Biomarker für Dekompensationsereignisse bei fortgeschrittener chronischer Lebererkrankung: Eine Interimsanalyse
Erhart L^{1,2}, Koutny F^{1,2,3}, Steiner-Gager E^{1,2}, Prosenz J^{1,2,3}, Dorn L^{1,2}, Pramhofer P^{1,2}, Schwarz M^{1,2}, Sandler R^{1,2}, Maieron A^{1,2,3}

¹Karl Landsteiner Universität für Gesundheitswissenschaften, Krems, Austria; ²Universitätsklinikum St. Pölten, Abteilung für Innere Medizin 2 Gastroenterologie & Hepatologie, St.Pölten, Austria; ³Paracelsus Medizinische Universität, Medical Science Research Program, Salzburg, Austria

P20 – Clinical Characteristics and Predictors of Cirrhosis in Autoimmune Hepatitis: Insights from an Austrian Cohort

Koutny F^{1,2,3}, Ortner M^{1,2}, Partik V², Birkl M^{1,2}, Maieron A^{1,2,3}, Prosenz J^{1,2,3}

¹Karl Landsteiner University of Health Sciences, Krems, Austria; ²University Hospital St. Pölten, Department of Internal Medicine 2 Gastroenterology & Hepatology, St.Pölten, Austria; ³Paracelsus Medical University, Medical Science Research Program, Salzburg, Austria

P21 – Abnahme der Vasopressin-Aktivierung nach TIPS-Implantation bei Leberzirrhose

Hartl L^{1,2,3}, Müllner-Bucsics T^{1,2,3}, Kappel J^{1,2,3}, Hintersteiner M^{1,2}, Dominik N^{1,2,3}, Hofer BS^{1,2,3,4}, Balcar L^{1,2,3}, Kramer G^{1,2,3,4}, Sebesta C^{1,2,3}, Thöne P^{1,2,3}, Reider L⁵, Schoder M⁵, Trauner M^{1,3}, Mandorfer M^{1,2,3}, Reiberger T^{1,2,3,4}

Posterausstellung

¹Medical University of Vienna, Division of Gastroenterology and Hepatology, Department of Medicine III, Vienna, Austria; ²Medical University of Vienna, Vienna Hepatic Hemodynamic Lab, Division of Gastroenterology and Hepatology, Department of Medicine III, Vienna, Austria; ³Medical University of Vienna, Clinical Research Group MOTION, Vienna, Austria; ⁴Medical University of Vienna, Christian Doppler Lab for Portal Hypertension and Liver Fibrosis, Vienna, Austria; ⁵Medical University of Vienna, Division of Interventional Radiology, Department of Radiology, Vienna, Austria

P22 – Multistate-Modelle identifizieren stadienabhängige Faktoren für den Verlauf chronisch fortgeschrittener Lebererkrankungen

Simbrunner B¹, Semmler G¹, Bofill Roig M², Meyer EL³, Balcar L¹, Jachs M¹, Hartl L¹, Hofer BS¹, Kramer G¹, Thöne P¹, Sebesta C¹, Dominik N¹, Scheiner B¹, Schwabl P¹, Staettermayr AF¹, Trauner M¹, Reiberger T¹, Mandorfer M¹

¹Medizinische Universität Wien, Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ²Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), Institute for Research and Innovation in Health (IRIS), Barcelona, Spain; ³Berry Consultants, Berry Consultants, Wien, Austria

P23 – Akute versus nicht akute Dekompensation bei Patienten mit Aszites als initialem Dekompensationsereignis

Simonis L¹, Balcar L¹, Schedlbauer A¹, Tonon M², Santori V², Stopfer K¹, Embacher J¹, Sebesta C¹, Hafner L¹, Hofer BS¹, Dominik N¹, Kramer G¹, Thöne P¹, Trauner M¹, Krag A³, Piano S², Mandorfer M¹, Reiberger T¹, Semmler G¹, Torp N³

¹Medizinische Universität Wien, Wien, Austria; ²University of Padova, Padova, Italy; ³Odense University Hospital, Odense, Denmark

P24 – Grenzen und Möglichkeiten nichtinvasiver Fibrosemessungen: Test-Retest-Reliabilität

Semmler G¹, Prier Lindvig K², Wu C², Simonis L¹, Embacher J¹, Hruska P¹, Andersen P², Balcar L¹, Jachs M¹, Trauner M¹, Krag A², Reiberger T¹, Scherzer T³, Mandorfer M¹, Thiele MS²

¹Medizinische Universität Wien, Wien, Austria; ²Odense University Hospital, Odense, Denmark; ³Sanatorium Hera, Wien, Austria

Posterausstellung

P25 – Assoziation von Metabolisch-assoziiierter steatotischer Lebererkrankung (MASLD) und Alkohol-assoziiierter Lebererkrankung (ALD) mit Atherosklerose: Eine Querschnittsanalyse

Bauer J¹, Gensluckner S¹, Eberhardt J¹, Akhgar A¹, Datz C², Iglseder B³, Patrick L⁴, Paulweber B¹, Trinka E⁵, Aigner E¹, Wernly B¹

¹Uniklinikum Salzburg, Innere Medizin I, Salzburg, Austria;

²Krankenhaus Oberndorf, Innere Medizin, Oberndorf bei Salzburg, Austria; ³Uniklinikum Salzburg, Geriatrie, Salzburg, Austria;

⁴Uniklinikum Salzburg, Neurologie, Salzburg, Austria; ⁵Uniklinikum Salzburg, Neurologie, Salzburg, Austria

P26 – Leber- und Milzsteifigkeitsmessung mittels transientser Elastographie zur Risikostratifizierung für hepatische Dekompensation: eine multizentrische europäische Kohortenstudie in cACLD-Patient:innen

Jachs M¹, Thöne P¹, Odriozola A², Turon F³, Moga L⁴, Téllez L⁵, Fischer P⁶, Saltini D⁷, Kwanten W⁸, Grasso M⁹, Llop E¹⁰, Mendoza Y¹¹, Armandi A¹², Pardo C³, Colecchia A⁷, Ravaioli F¹³, Maasoumy B¹⁴, Laleman W¹⁵, Presa J¹⁶, Schattenberg J¹⁷, Berzigotti A¹¹, Calleja J¹⁰, Calvaruso V⁹, Franque S⁸, Schepis F⁷, Procopet B⁶, Albillos A⁵, Rautou P⁴, Garcia-Pagan JC³, Puente Á², Fortea JI², Reiberger T¹, Mandorfer M¹

¹Medical University of Vienna, Vienna, Austria; ²Marqués de Valdecilla University Hospital, Santander, Spain; ³Hospital Clinic, Barcelona, Spain; ⁴Hopital Beaujon, Paris, France; ⁵Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, Spain; ⁶Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj, Romania; ⁷University of Modena & Reggio Emilia and Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Modena, Italy; ⁸Antwerp University Hospital, Antwerpen, Belgium; ⁹University of Palermo, Palermo, Italy; ¹⁰Universidad Autonoma de Madrid, Madrid, Spain; ¹¹Inselspital Bern, Bern, Switzerland; ¹²University of Turin, Turin, Italy; ¹³University of Bologna, Bologna, Italy; ¹⁴Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Germany; ¹⁵University Hospital Leuven, Leuven, Belgium; ¹⁶Liver Unit-CHTMAD, Vila Real, Portugal; ¹⁷Saarland University Medical Center, Homburg, Germany

P27 – Verbesserung der Versorgungsqualität und Patient:innenzufriedenheit für Patient:innen mit hepatozellulärem Karzinom durch den Einsatz einer spezialisierten Pflegeperson – Interimsanalyse der HCC-Care-Nurse Pilotstudie

Pajancic L^{1,2}, Balcar L^{1,2}, Kreuter A^{1,2}, Pomej K^{1,2}, Trauner M¹, Scheiner B^{1,2}, Pinter M^{1,2}

Posterausstellung

¹Medizinische Universität Wien, Univ. Klinik für Innere Medizin III -
Klin. Abtl. für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria;

²Medizinische Universität Wien, Vienna Liver Cancer Study Group -
Univ. Klinik für Innere Medizin III - Klin. Abtl. für Gastroenterologie
und Hepatologie, Wien, Austria

P28 – Modeling the reactive cholangiocyte phenotype in cholangiopathies using human biliary organoids for evaluation of novel therapeutic compounds

Heinreichsberger F, Pereyra D², Fuchs C¹, Trauner M¹

¹Medizinische Universität Wien, Klinische Abteilung für
Gastroenterologie & Hepatologie, Wien, Austria; ²Medizinische
Universität Wien, Klinische Abteilung für Viszeralchirurgie, Wien,
Austria

P29 – Rekompensation nach HCV-Heilung

Semmler G¹, Lens S², Hidalgo Á³, López S⁴, Pérez-Pérez M⁵, Dajti E⁶,
Martin K⁷, Zanaga P⁸, Hofer BS¹, Marino Z², Manzano ML³, Payeras I⁴,
Pons M⁵, Bruni A⁶, Zanetto A⁸, Burghart L⁹, Ecker D¹⁰, Simonis L¹,
Pocurull A⁴, Fritz L¹, Collazos C², Neumayer D¹, Balcar L¹, Jachs M¹,
Reiberger T¹, Russo FP⁸, Maasoumy B⁷, Genesca J¹¹, Bañares R⁴,
Forns X², Mandorfer M¹

¹Medizinische Universität Wien, Wien, Austria; ²Universitat de
Barcelona, Barcelona, Spain; ³Hospital Universitario 12 De Octubre,
Madrid, Spain; ⁴Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
Madrid, Spain; ⁵Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain;
⁶IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Bologna, Italy;
⁷Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Germany; ⁸Padua
University Hospital, Padua, Italy; ⁹Klinik Ottakring, Wien, Austria;
¹⁰Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern, Linz, Austria;
¹¹Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain

P30 – SERPINA1 Pi*MZ als unabhängiger Risikofaktor für die Entwicklung eines hepatozellulären Karzinoms bei Patient:innen mit chronisch fortgeschrittener Lebererkrankung

Balcar L¹, Semmler G¹, Scheiner B¹, Paternostro R¹, Simbrunner B¹,
Jachs M¹, Hartl L¹, Hofer B¹, Dominik N¹, Schwarz M¹, Kramer G¹,
Sebesta C¹, Thöne P¹, Pinter M¹, Trauner M¹, Reiberger T¹,
Stättermayer AF¹, Mandorfer M¹

¹Medizinische Universität Wien, Wien, Austria

Posterausstellung

P31 – Inter-Assay-/Inter-Labor-Vergleich des von-Willebrand-Faktor-Antigens als diagnostischer und prognostischer Biomarker bei chronisch fortgeschrittener Lebererkrankung

Balcar L¹, Zanetto A², Alberio L³, Adelmeijer J⁴, Simbrunner B¹, Bulato C², Matthey E³, Zermatten M³, Zinober K¹, Semmler G¹, Scheiner B¹, Trauner M¹, Reiberger T¹, Simioni P², Gomez FJ³, Lisman T⁴, Mandorfer M¹

¹Medizinische Universität Wien, Wien, Austria; ²University of Padua, Padua, Italy; ³University of Lausanne, Lausanne, Switzerland; ⁴University Medical Center Groningen, Groningen, Netherlands

P32 – Quality of clinical care & documentation in patients with autoimmune hepatitis – a retrospective probing study

Ortner M^{1,2}, Koutny F^{1,2,3}, Birkl M^{1,2}, Partik V¹, Maieron A^{1,2,3}, Prosenz J^{1,2,3}

¹Karl Landsteiner Universität, Health Sciences, Wien, Austria; ²Universitätsklinikum St. Pölten, Abteilung für Innere Medizin 2 Gastroenterologie & Hepatologie, St. Pölten, Austria; ³Paracelsus Unisversität, Medical Science Research Program, Salzburg, Austria

P33 – Dynamik der portalen Hypertension und Anwendbarkeit nicht-invasiver Tests nach Rekompensation bei alkoholbedingter Leberzirrhose

Hofer B^{1,2,3,4}, Semmler G^{1,2,3}, Balcar L^{1,2,3}, Dominik N^{1,2,3}, Kramer G^{1,2,3}, Sebesta C^{1,2,3}, Thöne P^{1,2,3}, Simbrunner B^{1,2,3,4}, Hintersteiner M^{1,2,3}, Stättermayer AF^{1,2}, Trauner M^{1,3}, Mandorfer M^{1,2,3}, Reiberger T^{1,2,3,4}

¹Medizinische Universität Wien, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Wien, Austria; ²Medizinische Universität Wien, Labor für hepatische Hämodynamik, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Wien, Austria; ³Medizinische Universität Wien, Klinische Forschungsgruppe MOTION, Wien, Austria; ⁴Medizinische Universität Wien, Christian Doppler Labor für Portale Hypertension und Fibrose bei Lebererkrankungen, Wien, Austria

Posterausstellung

P34 – Inzidenz und klinische Relevanz der hepatischen Rekompensation nach Alkoholabstinenz bei dekompensierter alkoholassoziierter Leberzirrhose – eine multizentrische Baveno Studie

Hofer B^{1,2,3,4}, **Tonon M**⁵, **Buttler L**⁶, **Pompili E**^{7,8}, **Camões Neves J**⁹, **Herms Q**¹⁰, **Cabello J**¹¹, **Gutmann D**¹², **Rodrigues SG**¹³, **Bouzbib C**¹⁴, **Marti Carretero A**¹⁵, **Lai JC**¹⁶, **Clemente Sánchez A**¹⁷, **Embacher J**, **Parandian L**¹, **Accetta A**⁵, **Gagliardi R**⁵, **Zaccherini G**^{7,8}, **Cervantes-Alvarez E**¹¹, **Semmler G**^{1,2,3}, **Mandorfer M**^{1,2,3}, **Bañares R**¹⁷, **Yip TC**¹⁶, **Genesca J**¹⁵, **Rudler M**¹⁴, **Tsochatzis E**¹², **Trebicka J**¹¹, **Pose E**¹⁰, **Costa D**⁹, **Caraceni P**^{7,8}, **Maasoumy B**⁶, **Piano S**⁵, **Reiberger T**^{1,2,3,4}

¹Medizinische Universität Wien, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Wien, Austria; ²Medizinische Universität Wien, Labor für hepatische Hämodynamik, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Wien, Austria; ³Medizinische Universität Wien, Klinische Forschungsgruppe MOTION, Wien, Austria; ⁴Medizinische Universität Wien, Christian Doppler Labor für Portale Hypertension und Fibrose bei Lebererkrankungen, Wien, Austria; ⁵University of Padova, Unit of Internal Medicine and Hepatology, Department of Medicine, Padua, Italy; ⁶Hannover Medical School, Department of Gastroenterology, Hepatology, Infectious Diseases and Endocrinology, Hannover, Germany; ⁷University of Bologna, Department of Medical and Surgical Sciences, Bologna, Italy; ⁸IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Unit of Semeiotics, Liver and Alcohol-Related Diseases, Bologna, Italy; ⁹Braga Hospital, Sete Fontes - São Victor, Gastroenterology Department, Braga, Portugal; ¹⁰Hospital Clínic de Barcelona, Liver Unit, Barcelona, Spain; ¹¹University of Münster, Department of Internal Medicine B, Münster, Germany; ¹²Royal Free London NHS Foundation Trust, Department of Hepatology and Liver Transplantation, London, United Kingdom; ¹³Inselspital, Bern University Hospital, Department of Visceral Surgery and Medicine, Bern, Switzerland; ¹⁴Sorbonne University, UPMC University Paris 06, AP-HP, Pitié-Salpêtrière Hospital, Paris, France; ¹⁵Liver Unit, Department of Internal Medicine, Hospital Universitari Vall d'Hebrón, Vall d'Hebron Research Institute (VHIR), Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus, CIBERehd, Universitat Autònoma de Barcelona,

Posterausstellung

Barcelona, Spain; ¹⁶Li Ka Shing Institute of Health Sciences, Department of Medicine and Therapeutics, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong; ¹⁷University Gregorio Marañón Hospital, IiSGM, CIBERehd, Liver Unit, Department of Gastroenterology, Madrid, Spain

P35 – The impact of donor and recipient HSD17B13, PNPLA3 and TM6SF2 genotype on post-transplant fibrosis, steatosis and survival in liver transplant recipients

***Troppmair MR**¹, Oberhuber L², Popottnigg J¹, Furtmüller L¹, Forer L³, Schoenherr S³, Weissensteiner H³, Glodny B⁴, Henninger B⁴, Kremser C⁴, Oberhuber R⁵, Tilg H¹, Zoller H¹, Schäfer B¹*

¹Abteilung für Innere Medizin I, Medizinische Universität Innsbruck, Innsbruck, Austria; ²Krankenhaus Meran, Abteilung für Innere Medizin, Meran, Italy; ³Medizinische Universität Innsbruck, Institut für Genetische Epidemiologie, Innsbruck, Austria; ⁴Abteilung für Radiologie, Medizinische Universität Innsbruck, Innsbruck, Austria; ⁵Medizinische Universität Innsbruck, Viszeral- Transplantations und Thoraxchirurgie, Innsbruck, Austria

P36 – AIXPLORE: Prospektive Studie zur nicht-invasiven Diagnostik einer klinisch signifikanten portalen Hypertension (CSPH) mittels 2D-SWE Milz- und Leber-Elastographie

***Bauer D**^{1,2,3}, Mathias J^{4,2,5}, Sebesta C^{1,2}, Hartl L^{4,2,5}, Schwarz M^{1,2}, Balcar L^{1,2,5}, Hofer B^{1,2,5,6}, Dominik N^{1,2,5}, Kramer G^{1,2,5,6}, Thöne P^{1,2,5}, Scheiner B^{1,2,6}, Stättermayer A^{1,2}, Simbrunner B^{1,2,5,6}, Schöchtner T¹, Haimberger F¹, Balutsch N¹, Trauner M^{1,5}, Mattias M^{1,2,5}, Reiberger T^{1,2,5,6}*

¹Medizinische Universität Wien, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Univ. Klin. f. Innere Medizin III, Wien, Austria; ²Medizinische Universität Wien, Vienna Hepatic Hemodynamic Lab, Wien, Austria; ³Klinik Ottakring, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ⁴Medizinische Universität Wien, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ⁵Medizinische Universität Wien, LBG Klinische Forschungsgruppe MOTION, Wien, Austria; ⁶Medizinische Universität Wien, Christian-Doppler Laboratory for Portal Hypertension and Liver Fibrosis, Wien, Austria

Posterausstellung

P37 – Vorhersage der 3- und 6- Monatsmortalität mit MELD-Scores und CLIF-C AD bei Patient:innen mit Leberzirrhose und Aszites

Wunderbaldinger A^{1,2}, Balcar L^{1,2}, Santori V^{3,4}, Torp N^{4,5}, Pompili E^{6,7}, Simonis L^{1,2}, Løbel C^{4,5}, Gagliardi R³, Embacher J^{1,2}, Israelsen M^{4,5}, Sebesta C^{1,2}, Johansen S^{4,5}, Hafner L^{1,2}, Trauner M¹, Mandorfer M^{1,2}, Reiberger T^{1,2}, Krag A^{4,5}, Caraceni P^{6,7}, Piano S³, Semmler G^{1,2,4,5}

¹Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria;

²Medizinische Universität Wien, Vienna Hepatic Hemodynamic Lab, Wien, Austria;

³Universität Padova, Abteilung für Innere Medizin und Hepatologie, Padova, Italy;

⁴Universitätsklinik Odense, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Zentrum für Leberforschung, Odense, Denmark;

⁵Süddänische Universität, Fakultät für Gesundheitswissenschaften, Abteilung für klinische Forschung, Odense, Denmark;

⁶Universität Bologna, Abteilung für medizinische und chirurgische Wissenschaften, Bologna, Italy;

⁷IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Abteilung für Semiotik, Leber und alkoholassoziierte Erkrankungen, Bologna, Italy

P38 – Psychological and Sociodemographic Predictors for Waitlist Enrollment, Liver Transplantation and Overall Survival

Lentsch J¹, Troppmair MR¹, Kohl C², Haslwanter-Egger N², Bath M¹, Oberhuber R³, Tilg H¹, Zoller H¹, Schäfer B¹

¹Abteilung für Innere Medizin I, Medizinische Universität Innsbruck, Innsbruck, Austria;

²Medizinische Universität Innsbruck, Universitätsklinik für Psychiatrie II, Innsbruck, Austria;

³Medizinische Universität Innsbruck, Viszeral- Transplantations und Thoraxchirurgie, Innsbruck, Austria

P39 – Characterization of Wilson's Disease Patients in Salzburg and Comparison of Treatment with Current EASL Guidelines

Widauer L¹, Völkerer A², Datz C², Strasser M³, Gensluckner S³, Aigner E³

¹Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg, 5020, Austria;

²Gesundheitszentrum Oberndorf, Innere Medizin, 5110 Oberndorf, Austria;

³Salzburger Landeskliniken, Universitätsklinik für Innere Medizin I, 5020 Salzburg, Austria

Posterausstellung

P40 – Influence of beta-blockers on the gut microbiome and metabolic profile in liver cirrhosis by sex

Haller R^{1,2}, Nepel M¹, Madl T^{3,4}, Habisch H³, Traub J⁵, Horvath A^{1,2}, Stadlbauer V^{1,2,4}

¹Medizinische Universität Graz, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Graz, Austria; ²CBmed GmbH, Graz, Austria;

³Medizinische Universität Graz, Otto Loewi Forschungszentrum, Graz, Austria; ⁴BioTechMed Graz, Graz, Austria; ⁵LKH-Universitätsklinikum Graz, Ernährungsmedizinischer Dienst, Graz, Austria

P41 – Nichtinvasive Stratifizierung der portalen Hypertension in Patienten mit BCR::ABL1-negativen myeloproliferativen Neoplasien

Hopp C¹, Degenfeld-Schonburg L², Balcar L¹, Kramer G¹, Graf I², Simonis L¹, Sillaber C², Gisslinger H³, Meischl T³, Stättermayer AF¹, Mandorfer M¹, Reiberger T^{1,4}, Trauner M¹, Scheiner B¹, Kraut M², Semmler G¹

¹Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Innere Medizin III - Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria;

²Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Innere Medizin I - Klinische Abteilung für Hämatologie und Hämostaseologie, Wien, Austria; ³Medizinische Universität Wien, Wien, Austria; ⁴CeMM, Wien, Austria

P42 – „The great imitator is back“ – cholestatische Hepatopathie bei Sekundärsyphilis

Genzluckner S¹, Strebinger G², Aigner E²

¹Universitätsklinikum Salzburg, Universitätsklinik für Innere Medizin 1, Salzburg, Austria; ²Universitätsklinikum Salzburg, Universitätsklinik für Innere Medizin 1, Salzburg, Austria

Posterausstellung

P43 – PNPLA3 potenziert das Risiko für fortgeschrittene Fibrose durch metabolische Dysfunktion und Alkohol bei einer steatotischen Leber
Embacher J^{1,2}, Semmler G^{1,2,3}, Gensluckner S⁴, Thöne P^{1,2,3}, Balcar L^{1,2,3}, Strasser M⁴, Zandanell S⁴, Feldman A⁴, Mandorfer M^{1,2,3}, Wernly B⁴, Aigner E⁴

¹Univ. Klinik für Innere Medizin III, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Medizinische Universität Wien, Wien, Austria; ²Vienna Hepatic Hemodynamic Lab, Medizinische Universität Wien, Wien, Austria; ³Klinische Forschungsgruppe MOTION, Medizinische Universität Wien, Wien, Austria; ⁴Univ. Klinik für Innere Medizin I, Landeskrankenhaus Salzburg (SALK) - Universitätsklinikum der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg, Salzburg, Austria

P44 – HCV-Prävalenz und Testraten unter Kindern mit neonatalem Abstinenzsyndrom und deren Müttern - unterschätzte Risikogruppen?
Schwarz C¹, Weiss A², Langthaler M^{2,3}, Tebruegge M^{2,3,4}, Gutic E¹, Bauer D¹, Burghart L¹, Baier-Grabner S^{2,3}, Käfer A², Endress D², Heissenberger-Mass IC², Reiberger T⁵, Wohlmuth C⁶, Zacharasiewicz A^{2,3}, Gschwantler M^{1,7}

¹Klinik Ottakring, 4. Med. Abteilung, Wien, Austria; ²Klinik Ottakring, Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde, Wien, Austria; ³Klinik Ottakring, Nationales Referenzzentrum für Tuberkulose im Kindesalter, Wien, Austria; ⁴University of Melbourne, Department of Paediatrics, Parkville, Australia; ⁵Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ⁶Klinik Ottakring, Gynäkologisch-geburtshilfliche Abteilung, Wien, Austria; ⁷Sigmund Freud Universität, Wien, Austria

Posterausstellung

P45 – Österreichisches Hepatitis D Register HEPAS – Therapie mit Bulevirtid: Ansprechraten, Add-on Interferon-Therapie, Therapiebeendigung

Schwarz M^{1,2}, Hintersteiner M¹, Schwarz C^{1,3}, Panzer M⁴, Pfisterer N⁵, Loschko N⁶, Hartl L¹, Dorn L², Laferl H⁷, Trauner M¹, Stättermayer AF¹, Mandorfer M¹, Graziadei I⁸, Maieron A², Moschen A⁶, Aigner E⁹, Stadlbauer V¹⁰, Madl C⁵, Aberle S¹¹, Zoller H⁴, Gschwantler M^{3,12}, Reiberger T¹, Jachs M¹

¹Medizinische Universität Wien, Univ. Klinik für Innere Medizin III, Klin. Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria;

²Universitätsklinikum Sankt Pölten, Abteilung für Innere Medizin 2, Sankt Pölten, Austria;

³Klinik Ottakring, Abteilung für Innere Medizin IV, Wien, Austria;

⁴Medizinische Universität Innsbruck, Abteilung für Innere Medizin I, Innsbruck, Austria;

⁵Klinik Landstraße, Abteilung für Innere Medizin IV, Wien, Austria;

⁶Johannes Kepler

Universitätsklinikum Linz, Abteilung für Innere Medizin 2, Linz, Austria;

⁷Klinik Favoriten, Abteilung für Innere Medizin IV, Wien, Austria;

⁸Landeskrankenhaus Hall in Tirol, Abteilung für Innere Medizin, Hall, Austria;

⁹Universitätsklinikum Salzburg, Universitätsklinik für Innere Medizin I, Salzburg, Austria;

¹⁰Universitätsklinikum Graz, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Graz, Austria;

¹¹Medizinische Universität Wien, Zentrum für Virologie, Wien, Austria;

¹²Sigmund Freud Privatuniversität, Wien, Austria

P46 – FIB-4 zur Identifizierung von PatientInnen mit chronischer Lebererkrankung, die eine HCC-Überwachung benötigen

Embacher J^{1,2}, Semmler G^{1,2,3}, Jachs M^{1,2,3}, Balcar L^{1,2,3}, Thöne P^{1,2,3}, Sebesta C^{1,2,3}, Dominik N^{1,2,3}, Kramer G^{1,2,3,4}, Hofer B^{1,2,3,4}, Hartl L^{1,2,3}, Simbrunner B^{1,2,3,4}, Scheiner B^{1,2}, Pinter M^{1,2}, Trauner M^{1,2,3,4}, Reiberger T^{1,2,3,4}, Mandorfer M^{1,2,3}

¹Univ. Klinik für Innere Medizin III, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Medizinische Universität Wien, Wien, Austria;

²Vienna Hepatic Hemodynamic Lab, Medizinische Universität Wien, Wien, Austria;

³Klinische Forschungsgruppe MOTION, Medizinische Universität Wien, Wien, Austria;

⁴Christian Doppler Labor für portale Hypertension und Leberfibrose, Medizinische Universität Wien, Wien, Austria

Posterausstellung

P47 – Exzellente Verträglichkeit und SVR12-Raten bei HCV-Therapie mit „direct-acting antiviral agents“ in Kindern – eine erste real-world Fallserie aus Österreich

Schwarz C¹, Weiss A², Langthaler M^{2,3}, Tebruegge M^{2,3,4}, Gutic E¹, Bauer D¹, Burghart L¹, Baier-Grabner S^{2,3}, Käfer A², Endress D², Heissenberger-Mass IC², Reiberger T⁵, Wohlmuth C⁶, Zacharasiewicz A^{2,3}, Gschwantler M^{1,7}

¹Klinik Ottakring, 4. Med. Abteilung, Wien, Austria; ²Klinik Ottakring, Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde, Wien, Austria; ³Klinik Ottakring, Nationales Referenzzentrum für Tuberkulose im Kindesalter, Wien, Austria; ⁴University of Melbourne, Department of Paediatrics, Parkville, Australia; ⁵Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ⁶Klinik Ottakring, Gynäkologisch- geburtshilfliche Abteilung, Wien, Austria; ⁷Sigmund Freud Universität, Wien, Austria

P48 – Dynamik von Leberfunktionsparameter nach 90-tägiger Abstinenz als Prädiktor für Rekompensation und leberbedingte Mortalität bei dekompensierter alkoholassoziierter Zirrhose

Embacher J^{1,2}, Parandian L¹, Semmler G^{1,2,3}, Balcar L^{1,2,3}, Dominik N^{1,2,3}, Kramer G^{1,2,3,4}, Sebesta C^{1,2,3}, Thöne P^{1,2,3}, Hartl L^{1,2,3}, Jachs M^{1,2,3}, Simbrunner B^{1,2,3,4}, Trauner M^{1,2,3,4}, Mandorfer M^{1,2,3}, Reiberger T^{1,2,3,4}, Hofer B^{1,2,3,4}

¹Univ. Klinik für Innere Medizin III, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Medizinische Universität Wien, Wien, Austria; ²Vienna Hepatic Hemodynamic Lab, Medizinische Universität Wien, Wien, Austria; ³Klinische Forschungsgruppe MOTION, Medizinische Universität Wien, Wien, Austria; ⁴Christian Doppler Labor für portale Hypertension und Leberfibrose, Medizinische Universität Wien, Wien, Austria

Posterausstellung

P49 – Circulating antibody score identifies patients with HCC with a favourable outcome following immunotherapy

Scheiner B¹, Reyna-Blanco C², Gorgulho J³, Prinzensteiner M², Balcar L¹, Pomej K¹, Trauner M¹, von Felden J³, Pinter M¹, Vogl T²
¹Medizinische Universität Wien, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Univ.-Klinik für Innere Medizin III, Wien, Austria;
²Medizinische Universität Wien, Institut für Krebsforschung, Wien, Austria; ³Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, II. Medizinische Abteilung, Hamburg, Germany

P50 – Prävalenz fortgeschrittener Leberfibrose unter Risikopatient:innen für steatotische Lebererkrankungen in der Primär-, Sekundär- und Tertiärversorgung

Thöne P^{1,2}, Semmler G^{1,2,3,4}, Embacher J¹, Hruska P¹, Simonis L¹, Stopfer K¹, Fritz L¹, Köck F¹, Balcar L^{1,2}, Hofer BS^{1,2}, Wernly B^{5,6}, Gensluckner S⁶, Strasser M⁶, Völkerer A⁵, Lindvig K^{3,4}, Wernly S^{5,6}, Winker R⁷, Reiberger T^{1,2}, Mandorfer M^{1,2}, Thiele M^{3,4}, Trauner M^{1,2}, Datz C⁵, Scherzer T⁷, Aigner E⁶
¹Klinik für Innere Medizin III, Universitätsklinikum AKH Wien, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ²Klinik für Innere Medizin III, Universitätsklinikum AKH Wien, Vienna Hepatic Hemodynamic Lab, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ³Odense University Hospital, Centre for Liver Research, Department of Gastroenterology and Hepatology, Odense, Denmark; ⁴University of Southern Denmark, Institute of Clinical Research, Faculty of Health Sciences, Odense, Denmark; ⁵Allgemeines Krankenhaus der Stadt Oberndorf, Lehrkrankenhaus der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg, Abteilung für Innere Medizin, Oberndorf, Austria; ⁶Paracelsus Medizinische Universität, Klinik für Innere Medizin I, Salzburg, Austria; ⁷Sanatorium Hera, Gesundheits- und Präventionszentrum, Wien, Austria

Posterausstellung

P51 – Monitoring der HVPB-Response auf intravenöses Propranolol mittels wiederholter Milzsteifigkeitsmessung: Eine europäische Multi-zenterstudie.

Thöne P^{1,2}, Saltini D³, Calvão J⁴, Balcar L^{1,2}, Guasconi T³, Semmler G^{1,2,5,6}, Stättermayer A^{1,2}, Trauner M^{1,2}, Reiberger T^{1,2}, Presa J⁴, Schepis F³, Mandorfer M^{1,2}, Jachs M^{1,2}

¹Klinik für Innere Medizin III, Universitätsklinikum AKH Wien, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ²Klinik für Innere Medizin III, Universitätsklinikum AKH Wien, Vienna Hepatic Hemodynamic Lab, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ³Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Severe Liver Diseases Unit (M.E.C.), Department of Medical Specialties, Modena, Italy; ⁴Hospital of Vila Real, Liver Unit-CHTMAD, Vila Real, Portugal; ⁵Odense University Hospital, Centre for Liver Research, Department of Gastroenterology and Hepatology, Odense, Denmark; ⁶University of Southern Denmark, Institute of Clinical Research, Faculty of Health Sciences, Odense, Denmark

P52 – Prognostische Validierung der laborbasierten 3P/5P-Riskomodelle für portale Hypertension bei kompensierter fortgeschrittener chronischer Lebererkrankung

Kramer G^{1,2,3,4}, Simbrunner B^{1,2,3,4}, Jachs M^{1,2,3}, Balcar L^{1,2,3}, Hofer B^{1,2,3,4}, Dominik N^{1,2,3}, Hartl L^{1,2,3}, Schwarz M^{1,2}, Petrenko O^{1,4,5,6,7}, Semmler G^{1,2,3}, Reinis J⁵, Sebesta C^{1,2,3}, Thöne P^{1,2,3}, Schwabl P^{1,2,3,4}, Stättermayer A^{1,2}, Trauner M^{1,3}, Mandorfer M^{1,2,3}, Reiberger T^{1,2,3,4}

¹Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ²Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Labor für hepatische Hämodynamik, Wien, Austria; ³Medizinische Universität Wien, Klinische Forschungsgruppe MOTION, Wien, Austria; ⁴Medizinische Universität Wien, Christian Doppler Labor für Portale Hypertension und Fibrose bei Lebererkrankungen, Wien, Austria; ⁵CeMM Forschungszentrum für Molekulare Medizin, Wien, Austria; ⁶Medizinische Universität Wien, Klinisches Institut für Labormedizin, Wien, Austria; ⁷Ukrainisches Institut für Systembiologie und Medizin, Kiev, Ukraine

Posterausstellung

P53 – Innovativer MELD-Copeptin-Score zur präzisen Vorhersage von ACLF und leberbedingter Mortalität bei PatientInnen mit dekompensierter Zirrhose

Hintersteiner M^{1,2}, Simbrunner B^{1,2,3}, Jachs M^{1,2}, Hofer BS^{1,2}, Bauer DJM^{1,2}, Dominik N^{1,2}, Schwarz M^{1,2}, Balcar L^{1,2}, Kramer G^{1,2}, Marculescu R⁴, Trauner M¹, Mandorfer M^{1,2}, Reiberger T^{1,2,3}, Hartl L^{1,2}

¹Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Wien, Austria; ²Vienna Hepatic Hemodynamic Lab, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Wien, Austria; ³Christian-Doppler-Labor für portale Hypertonie und Leberfibrose, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Wien, Austria; ⁴Klinisches Institut für Labormedizin, Medizinische Universität Wien, Wien, Austria

P54 – Effektivität einer Low-Carb Formuladiät in PatientInnen mit MASLD

Hruska P^{1,2}, Semmler G^{1,3,4,2}, Teufelhart T M⁵, Winker R⁵, Rabitsch C⁵, Mehl B⁵, Ferenci T P¹, Hofer H⁶, Haslacher H⁷, Scherzer T^{5,8}

¹Medizinische Universität Wien, Gastroenterologie und Hepatologie, Innere Medizin III, Wien, Austria; ²Medizinische Universität Wien, Vienna Hepatic Hemodynamic Lab, Gastroenterologie und Hepatologie, Innere Medizin III, Wien, Austria; ³Odense University Hospital, Centre for Liver Research, Department of Gastroenterology and Hepatology, Odense, Denmark; ⁴University of Southern Denmark, Institute of Clinical Research, Faculty of Health Sciences, Odense, Denmark; ⁵Sanatorium Hera, Health and Prevention Center, Wien, Austria; ⁶Krankenhaus Wels-Grieskirchen, Innere Medizin I, Wels, Austria; ⁷Medizinische Universität Wien, Labormedizin, Wien, Austria; ⁸Universitätsklinikum Wiener Neustadt, Gastroenterologie und Hepatologie, Medizin I, Wiener Neustadt, Austria

Posterausstellung

P55 – Die Größe der spontanen portosystemischen Shunts (Kollateralen) verringert sich nach TIPS-Implantation und zeigt Auswirkungen auf die Prognose

Hintersteinger M^{1,2}, Müllner-Bucsics T^{1,2}, Riegler S¹, Dominik N^{1,2}, Kramer G^{1,2}, Sebesta C^{1,2}, Thöne P^{1,2}, Reider L³, Schoder M³, Trauner M¹, Mandorfer M^{1,2}, Reiberger T^{1,2,4}, Hartl L^{1,2}, Lampichler K⁵
¹Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Wien, Austria; ²Vienna Hepatic Hemodynamic Lab, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Wien, Austria; ³Klinische Abteilung für Kardiovaskuläre und Interventionelle Radiologie, Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin, Wien, Austria; ⁴Christian-Doppler-Labor für portale Hypertonie und Leberfibrose, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Wien, Austria; ⁵Klinische Abteilung für Allgemeine Radiologie und Kinderradiologie, Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin, Wien, Austria

P56 – Erhöhte Lipasewerte beim akut-auf-chronischen Leberversagen (ACLF) sind mit einer erhöhten Mortalität assoziiert

Kramer G^{1,2,3,4}, Taru V^{1,4,5}, Simbrunner B^{1,2,3,4}, Dominik N^{1,2,3}, Balcar L^{1,2,3}, Hofer B^{1,2,3,4}, Jachs M^{1,2,3}, Hartl L^{1,2,3}, Sebesta C^{1,2,3}, Hintersteinger M^{1,2,3}, Thöne P^{1,2,3}, Semmler G^{1,2,3}, Schneeweiß-Gleixner M¹, Schwabl P^{1,2,3,4}, Trauner M^{1,3}, Mandorfer M^{1,2,3}, Reiberger T^{1,2,3,4}

¹Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ²Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Labor für hepatische Hämodynamik, Wien, Austria; ³Medizinische Universität Wien, Klinische Forschungsgruppe MOTION, Wien, Austria; ⁴Medizinische Universität Wien, Christian Doppler Labor für Portale Hypertension und Fibrose bei Lebererkrankungen, Wien, Austria; ⁵Iuliu Hatieganu Universität für Medizin und Pharmazie, 4. Abteilung für Innere Medizin und „Octavian Fodor“ Regionales Institut für Gastroenterologie und Hepatologie, Abteilung Hepatologie, Cluj, Romania

Posterausstellung

P57 – Controlled Expansion TIPS – Erfahrungen eines Tertiärzentrums

Hintersteiner M^{1,2}, Kappel J^{1,2}, Müllner-Bucsics T^{1,2}, Hofer BS^{1,2},
Dominik N^{1,2}, Kramer G^{1,2}, Balcar L^{1,2}, Sebesta C^{1,2}, Thöne P^{1,2},
Reider L³, Trauner M¹, Mandorfer M^{1,2}, Reiberger T^{1,2,4}, Hartl L^{1,2}

¹Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Wien, Austria; ²Vienna Hepatic Hemodynamic Lab, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Wien, Austria; ³Klinische Abteilung für Kardiovaskuläre und Interventionelle Radiologie, Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin, Wien, Austria; ⁴Christian-Doppler-Labor für portale Hypertonie und Leberfibrose, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Wien, Austria

P58 – Rolle von Child-Turcotte-Pugh und ALBI Scores in Patient:innen mit non-zirrhotischem hepatozellulärem Karzinom

Kreuter A¹, Brunetti L^{2,3}, Balcar L¹, Fulgenzi CAM³, Meischl T^{1,4},
D'Alessio A^{2,5}, Pomej K¹, Cheon J⁶, Nishida N⁷, Lee P⁸, Wu L⁹, Ang C⁹,
Krall A¹⁰, Saeed A¹¹, Stefanini B¹², Pressiani T¹³, Abugabal Y¹⁴,
Chamseddine S¹⁴, Wietharn B¹⁵, Parisi A¹⁶, Huang Y¹⁷, Phen S¹⁸,
Vivaldi C¹⁹, Salani F²⁰, Masi G²⁰, Röhlen N²¹, Vogel A²², von Felden J²³,
Schulze K²³, Silletta M², Trauner M¹, Samson A²⁴, Wege H²³,
Piscaglia F¹², Galle P²⁵, Stauber R¹⁰, Kudo M⁷, Singal A¹⁸, Andanamala H²⁶,
Ulahannan S²⁶, Parikh N²⁷, Cortellini A^{3,2}, Kaseb A¹⁴, Rimassa L^{13,28},
Jae Chon H⁷, Celsa C^{2,29}, Arvind A¹⁴, Li M³⁰, Manfredi G^{2,5}, Cabibbo G²⁹,
Kelley RK³¹, El Tomb P¹⁵, Scheiner B¹, Pinato D^{2,5}, Pinter M¹

¹Medizinische Universität Wien, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ²Imperial College London, Department of Surgery and Cancer, London, United Kingdom; ³Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Operative Research Unit of Medical Oncology, Rom, Italy; ⁴Hanusch Krankenhaus, 3. Medizinische Abteilung (Hämatologie & Onkologie), Wien, Austria; ⁵University of Piemonte Orientale, Department of Translational Medicine, Novara, Italy; ⁶CHA Bundang Medical Centre, Medical Oncology, Department of Internal Medicine, Seongnam, Korea, Republic of; ⁷Kindai University, Department of Gastroenterology and Hepatology, Osaka, Japan; ⁸Taipei Veterans General Hospital, Department of Medicine, Taipei, Taiwan, Province of China; ⁹Tisch Cancer Institute, Department of Medicine, New York, United States; ¹⁰Medizinische Universität Graz, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Graz, Austria; ¹¹University of Pittsburgh (UPMC), Division of Hematology/Oncology,

Posterausstellung

Department of Medicine, Pittsburgh, United States; ¹²IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Division of Internal Medicine, Bologna, Italy; ¹³IRCCS Humanitas Research Hospital, Medical Oncology and Hematology Unit, Rozzano, Italy; ¹⁴The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Dept of Gastrointestinal Medical Oncology, Houston, United States; ¹⁵University of Kansas Cancer Center, Department of Medicine, Westwood, United States; ¹⁶Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, Department of Oncology, Ancona, Italy; ¹⁷National Yang Ming Chiao Tung University School of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Taipei, Taiwan, Province of China; ¹⁸University of Texas Southwestern Medical Center, Department of Internal Medicine, Dallas, United States; ¹⁹University Hospital of Pisa, Unit of Medical Oncology 2, Pisa, Italy; ²⁰University of Pisa, Department of Translational Research and New Technologies in Medicine and Surgery, Pisa, Italy; ²¹Universitätsklinikum Freiburg, Klinik für Innere Medizin II (Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie, und Infektiologie), Freiburg, Germany; ²²Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie und Endokrinologie, Hannover, Germany; ²³Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, I. Medizinische Klinik, Hamburg, Germany; ²⁴School of Medicine, Faculty of Medicine and Health, Leeds Institute of Medical Research at St. James's, Leeds, United Kingdom; ²⁵Universitätsmedizin Mainz, I. Medizinische Klinik, Mainz, Germany; ²⁶University of Oklahoma Health Sciences Center, Stephenson Cancer Center, Oklahoma City,, United States; ²⁷University of Michigan, Department of Internal Medicine, Ann Arbor, United States; ²⁸Humanitas University, Department of Biomedical Sciences, Pieve Emanuele, Italy; ²⁹University of Palermo, Department of Health Promotion, Mother & Child Care, Internal Medicine & Medical Specialties, Palermo, Italy; ³⁰University of California, Department of Internal Medicine, San Francisco, United States; ³¹University of California, Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, San Francisco, United States

Posterausstellung

P59 – Prognoseeinschätzung bei Lebererkrankungen mittels ARFI-basierter Lebersteifigkeitsmessung unter Anwendung der WFUMB-„Rule-of-4“

Sebesta C^{1,2,3}, Kramer G^{1,2,3,4}, Dominik N^{1,2,3}, Hofer B^{1,2,3,4}, Balcar L^{1,2,3}, Thöne P^{1,2,3}, Jachs M^{1,2,3}, Hartl L^{1,2,3,4}, Simbrunner B^{1,2,3,4}, Schöchtner T¹, Haimberger F¹, Balutsch N¹, Stättermayer A^{1,2}, Trauner M^{1,3}, Mandorfer M^{1,2,3}, Reiberger T^{1,2,3,4}, Bauer D^{5,2,1}

¹Medizinische Universität Wien, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Innere Medizin III, Wien, Austria;

²Vienna Hepatic Hemodynamic Lab, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Innere Medizin III, Wien, Austria;

³LBG Forschungsgruppe MOTION, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Innere Medizin III, Wien, Austria;

⁴Christian-Doppler Labor für Portale Hypertension und Leberfibrose, Medizinische Universität Wien, Wien, Austria; ⁵Klinik Ottakring, Innere Medizin IV, Wien, Austria

P60 – Rauchen verstärkt Entzündungsprozesse, fördert Fibrogenese und Angiogenese, und erhöht das Krebsrisiko bei Patient:innen mit Leberzirrhose

Dominik N^{1,2,3}, Simbrunner B^{1,2,3}, Scheiner B^{1,2,3}, Schwarz M^{1,2}, Hartl L^{1,2,3}, Jachs M^{1,2,3}, Balcar L^{1,2,3}, Semmler G^{1,2,3}, Kramer G^{1,2,3}, Sebesta C^{1,2,3}, Trauner M^{1,3}, Pinter M¹, Mandorfer M^{1,2,3}, Reiberger T^{1,2,3}, Hofer B^{1,2,3}

¹Medizinische Universität Wien, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ²Medizinische Universität Wien, Vienna Hepatic Hemodynamic Lab, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ³Medizinische Universität Wien, LBG

Klinische Forschungsgruppe MOTION, Wien, Austria

Posterausstellung

P61 – Diagnostische und klinische Implikationen eines hohen Milz-zu-Leber-Steifigkeitsverhältnisses bei MASLD – eine prospektive Studie

Sebesta C^{1,2,3}, Jachs M^{1,2,3}, Hartl L^{1,2,3,4}, Schwarz M^{1,2}, Balcar L^{1,2,3}, Hofer B^{1,2,3,4}, Dominik N^{1,2,3}, Kramer G^{1,2,3,4}, Scheiner B^{1,2,3}, Stättermayer A^{1,2}, Simbrunner B^{1,2,3,4}, Schöchtner T¹, Haimberger F¹, Balutsch N¹, Trauner M^{1,3}, Mandorfer M^{1,2,3}, Reiberger T^{1,2,3,4}, Bauer D^{5,2,1}

¹Medizinische Universität Wien, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Innere Medizin III, Wien, Austria;

²Vienna Hepatic Hemodynamic Lab, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Innere Medizin III, Wien, Austria;

³LBG Forschungsgruppe MOTION, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Innere Medizin III, Wien, Austria;

⁴Christian-Doppler Labor für Portale Hypertension und Leberfibrose, Medizinische Universität Wien, Wien, Austria; ⁵Klinik Ottakring, Innere Medizin IV, Wien, Austria

P62 – Früherkennung lysosomaler Speichererkrankungen bei Patientinnen mit NAFLD: Ent-wicklung des NAFLD-LSD Tools

Wiesinger A^{1,2}, Zimmermann G^{3,4}, Lauth W³, Muschol NM⁵, Möslinger D⁶, Konstantopoulou V⁶, Scholl-Buergi S⁷, Karall D⁷, Giugliani R⁸, Meng E⁹, Aigner E¹⁰, Weghuber D¹¹, Lagler F¹

¹Paracelsus Medical University, Institute of Inherited Metabolic Diseases, Salzburg, Austria; ²European Reference Network for Hereditary Metabolic Diseases, Udine, Italy; ³Paracelsus Medical University, Biostatistics and Big Medical Data, IDA Lab, Salzburg, Austria;

⁴Paris Lodron University, Department of Artificial Intelligence and Human Interfaces, Salzburg, Austria; ⁵University Medical Center Hamburg-Eppendorf, International Center for Lysosomal Disorders (ICLD), Department of Pediatrics, Hamburg, Germany;

⁶Medical University of Vienna, Department for Pediatrics and Adolescent Medicine, Inborn Errors of Metabolism, Wien, Austria; ⁷Medical University Innsbruck, Department of Pediatrics, Innsbruck, Austria;

⁸UFRGS Porto Alegre, Department of Genetics, Porto Alegre - Rio Grande do Sul, Brazil; ⁹SphinCS GmbH, Institute of Clinical Science for LSD, Hochheim, Germany; ¹⁰Paracelsus Medical University, Obesity Research Unit, Salzburg, Austria; ¹¹University Hospital Salzburg, Department of Pediatrics, Salzburg, Austria

Posterausstellung

P63 – From Throat to Threat: Lemierre’s Syndrome as a Rare Cause of Hepatic Abscess – A Case Report

Rathenböck MD¹, Moschen A¹

¹Kepler Universitätsklinikum, Interne 2 - Gastroenterologie & Hepatologie, Linz, Austria

P64 – Transsplenic Portal Vein Recanalization followed by TIPS in Chronic Portal Vein Thrombosis: A Retrospective Cohort Study

Furtmüller L¹, Freund M², Loizides A², Pammer LM¹, Troppmair MR¹, Tilg H¹, Zoller H¹, Schäfer B¹

¹Medizinische Universität Innsbruck, Innere Medizin I, Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie und Stoffwechsel, Innsbruck, Austria; ²Medizinische Universität Innsbruck, Universitätsklinik für Radiologie, Innsbruck, Austria

P65 – Portosystemic shunting is the key driver of portal/splanchnic vein thrombosis development

Wunderbaldinger A¹, Balcar L¹, Calvão J¹, Semmler G¹, Scheiner B¹, Kramer G¹, Simbrunner B¹, Jachs M¹, Hartl L¹, Hofer B¹, Dominik N¹, Sebesta C¹, Thöne P¹, Hintersteiner M¹, Stättermayer AF¹, Trauner M¹, Reiberger T¹, Mandorfer M¹

¹Medizinische Universität Wien, Wien, Austria

P66 – Impact of genetic polymorphisms on treatment efficacy in patients with hepatocellular carcinoma

Balcar L¹, Berger V¹, Gorgulho J², Klotz A¹, Pomej K¹, Trauner M¹, von Felden J², Pinter M¹, Scheiner B¹

¹Medizinische Universität Wien, Wien, Austria; ²University Medical Center Hamburg-Eppendorf, II. Department of Medicine, Hamburg, Germany

P67 – ACBP/DBI as a possible prognostic marker for weight loss in patients undergoing bariatric surgery

Grabherr F¹, Meyer M¹, Grander C¹, Enrich B¹, Gruber P¹, Effenberger M¹, Tilg H¹

¹Medical University of Innsbruck, Department of Internal Medicine I, Gastroenterology, Hepatology and Endocrinology, Innsbruck, Austria

Posterausstellung

P68 – Choledochuszyste als seltene Ursache bei Choledocholithiasis

Steidl K¹, Franzi M¹, Tschmelitsch J², Müller M², Aigner A², Gröchenig HP¹

¹KH Barmherzige Brüder und Akademisches Lehrkrankenhaus, Abteilung für Innere Medizin, St Veit an der Glan, Austria;

²KH Barmherzige Brüder und Akademisches Lehrkrankenhaus, Abteilung für Chirurgie, St Veit an der Glan, Austria

P69 – Chef created liver focused 14 days diet reduces overweight and fat content in a MASLD cohort

Fuchs E¹, Dax K¹, Innitzer-Klamper B¹, Schiessling M¹, Rockenbauer L¹, Kiss-Haider D¹, Ferlitsch A¹

¹Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien, Abteilung f. Innere Medizin I, Wien, Austria

4. Endoskopie

P70 – Development of an ERCP Learning Assessment Tool: A Digital Approach to Tracking Procedural Competence

Erhart L^{1,2}, Maieron A^{1,2}

¹Universitätsklinikum St. Pölten, Innere Medizin 2 (Gastroenterologie und Hepatologie), St. Pölten, Austria; ²Karl Landsteiner

Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Krems, Austria

P71 – ÖGGH-Förderungsstipendium für Nachwuchsendoskopiker:innen – Where the money went

Bernhofer S^{1,2}, Maieron A^{1,2,3}

¹Karl Landsteiner University of Health Sciences, Krems, Austria;

²University Hospital St. Pölten, Department of Internal Medicine 2 Gastroenterology & Hepatology, St. Pölten, Austria; ³Paracelsus

Medical University, Medical Science Research Program, Salzburg, Austria

Posterausstellung

P72 – The immune profiles of high-risk colorectal cancer precursors depend on colorectal cancer screening starting age and sex

Zessner-Spitzenberg J¹, Bognar F¹, Sorz-Nechay T¹, Neudert B², Trauner M¹, Kain R², Ferlitsch M^{1,3}, Waldmann E¹

¹Medizinische Universität Wien, Klinik für Innere Medizin III, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien, Austria; ²Abteilung für Pathologie, Medizinische Universität Wien, Wien, Austria; ³Klinik Floridsdorf, Abteilung für Gastroenterologie, Wien, Austria

P73 – Insights into trainee endoscopist-CADx artificial intelligence interaction – exploratory analysis of data from a prospective observational study of CADx-supported trainee endoscopist diagnostic competency

Marko V¹, Prosenz J^{2,3,4}, Bernhofer S^{2,3}, Venturi D^{2,3}, Koutny F^{2,3,4}, Maieron A^{2,3,4}

¹Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Faculty of Postgraduate Education, Lviv, Ukraine; ²Karl Landsteiner University of Health Sciences, Krems, Austria; ³University Hospital St. Pölten, Department of Internal Medicine 2 Gastroenterology & Hepatology, St. Pölten, Austria; ⁴Paracelsus Medical University, Medical Science Research Program, Salzburg, Austria

P74 – Somatische Mosaik im APC-Gen: Stolperfälle bei der Diagnose einer familiären adenomatösen Polyposis (FAP)

Baumann-Durchschein F¹, Bauchinger S², Kashofer K³, Pollheimer M³, Schreiner E⁴, Gulden L¹, Geigl J⁴, Högenauer C¹

¹Medizinische Universität Graz, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Graz, Austria; ²Medizinische Universität Graz, Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Graz, Austria; ³Medizinische Universität Graz, Diagnostik & Forschungsinstitut für Pathologie, Graz, Austria; ⁴Medizinische Universität Graz, Diagnostik & Forschungsinstitut für Humangenetik, Graz, Austria

Posterausstellung

P75 – Zeitliche Entwicklung der Leitlinienkonformität in der Nachsorge nach Polypektomie: Analyse von über 90.000 Koloskopien

Daniela P^{1,2}, Zessner-Spitzenberg J³, Waldmann E³, Bognar F^{4,4}, Selinger T^{4,4}, Demschik A^{4,4}, Trauner M³, Ferlitsch M^{2,4,1}

¹Quality Assurance Working Group, Austrian Society of Gastroenterology and Hepatology, Wien, Austria; ²Klinik Floridsdorf, Innere Medizin/Gastroenterologie mit AGR, Wien, Austria; ³Medizinische Universität, Wien, Austria; ⁴Division of Gastroenterology and Hepatology, Medical University of Vienna, Department of Internal Medicine III, Wien, Austria

P76 – Der Einfluss periampullärer Divertikel auf Erfolgs- und Komplikationsraten bei ERCP: Ergebnisse aus der Österreichischen Qualitätssicherungsmaßnahme „Benchmarking ERCP“

Meierhofer C¹, Duller C², Wewalka F³, Kapral C¹

¹Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern, Interne IV - Gastroenterologie und Hepatologie, Linz, Austria; ²Johannes Kepler Universität, Institut für Angewandte Statistik, Linz, Austria; ³Kepler Universitätsklinikum, Interne 2, Linz, Austria

P77 – Wie erfolgreich und komplikativ ist eine Folgeuntersuchung nach frustraner ERCP? – Daten aus dem Österreichischen Benchmarking ERCP

Meierhofer C¹, Duller C², Wewalka F³, Kapral C¹

¹Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern, Interne IV - Gastroenterologie und Hepatologie, Linz, Austria; ²Johannes Kepler Universität, Institut für Angewandte Statistik, Linz, Austria; ³Kepler Universitätsklinikum, Interne 2, Linz, Austria

P78 – Erfolgsrate, Sicherheit und Rolle der Antibiotikaphylaxe bei Cholangioskopien: Ergebnisse aus der Österreichischen Qualitätssicherungsmaßnahme „Benchmarking ERCP“

Meierhofer C¹, Duller C², Maieron A³, Wewalka F⁴, Kapral C¹

¹Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern, Interne IV - Gastroenterologie und Hepatologie, Linz, Austria; ²Johannes Kepler Universität, Institut für Angewandte Statistik, Linz, Austria; ³Universitätsklinikum St. Pölten, Innere Medizin 2, St. Pölten, Austria; ⁴Kepler Universitätsklinikum, Interne 2, Linz, Austria

Posterausstellung

P79 – Buried LAMS nach endoskopischer Gallenblasendrainage

Rainer F¹, Blesl A¹, Spindelböck W¹, Schlager H¹, Högenauer C¹

¹Medizinische Universität Graz, Klinische Abteilung für
Gastroenterologie & Hepatologie, Graz, Austria

5. CED

P80 – Effects of Mirikizumab Versus Placebo on Histologic Inflammation Evaluated by Comprehensive Assessment in 5 Intestinal Segments in a Randomized Controlled Phase 3 Trial of Participants with Crohn's Disease

Jairath V¹, Magro F², De Hertogh G³, Feagan B⁴, Harpaz N⁵, Hisamatsu T⁶, D'Haens G⁷, Pai R⁸, Lin Z⁹, Morris N⁹, Protic M⁹, Hon E⁹, Owen C⁹, Escobar R⁹, Reinisch W¹⁰

¹Western University, London, Canada; ²University of Porto, Faculty of Medicine, Porto, Portugal; ³KU Leuven, Department of Imaging and Pathology, Leuven, Belgium; ⁴Alimentiv Inc., London, Canada; ⁵Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Department of Oncological Sciences, New York, United States; ⁶Kyorin University, Tokyo, Japan; ⁷Amsterdam University Medical Centers, Inflammatory Bowel Disease Centre, Amsterdam, Netherlands; ⁸Mayo Clinic, Department of Laboratory Medicine and Pathology, Scottsdale, United States; ⁹Eli Lilly and Company, Indianapolis, United States; ¹⁰Medical University of Vienna, Wien, Austria

P81 – Patients with Inflammatory Bowel Disease Do Not Have an Increased Risk of Atherosclerosis – Analysis from the Paracelsus 10,000 Study

Akhgar A¹, Feldman A¹, Bauer J¹, Eberhardt J¹, Iglseder B², Trinkla E³, Paulweber B¹, Aigner E¹, Zandanell S¹, Wernly B¹

¹Paracelsus Medizinische Universität, Uniklinik für Innere Medizin I, Salzburg, Austria; ²Paracelsus Medizinische Universität, Universitätsklinik für Geriatrie, Salzburg, Austria; ³Universitätsklinik für Neurologie, Paracelsus Medizinische Universität, Salzburg, Austria

Posterausstellung

P82 – Clinical outcome of acute severe ulcerative colitis – a single center, retrospective study

Schuster L¹, Blesl A¹, Fürst S¹, Binder L¹, Baumann-Durchschein F¹, Fuchs T¹, Constantini-Kump P¹, Heimo W¹, Högenauer C¹

¹Medical University of Graz, Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology and Hepatology, Graz, Austria

P83 – Interim analysis of real-world-data on PRO and biomarker remission in patients with IBD

Bäuerle M¹, Fierens L², Primas C¹, Ferrante M², Schreiner P¹, Dabsch S¹, Schilling V¹, Frick A¹, Reinisch W¹, Schweiger K¹, Ritschl V¹, Mosor E¹, Long PA¹, Winkler E¹, Mooslechner T¹, Wisniowski K¹,

Kazemi-Shirazi L¹, Dejaco C¹, Trauner M¹, Stamm T¹, Novacek G¹

¹Medizinische Universität Wien, Wien, Austria;

²Medizinische Universität Leuven, Leuven, Belgium

P84 – RXRA in Paneth cells as driver of intestinal inflammation

Meyer M¹, Grabherr F¹, Plattner C², Marteau V², Schwärzler J¹, Mayr L¹, Jukic A¹, Enrich B¹, Hilbe R¹, Rieder D², Grander C¹, Zollner A¹, IBDome Consortium T³, Tilg H¹, Trajanoski Z², Adolph TE¹

¹Medical University of Innsbruck, Department of Internal Medicine I, Gastroenterology, Hepatology, Endocrinology & Metabolism, Innsbruck, Austria; ²Medical University of Innsbruck, Biocenter, Institute of Bioinformatics, Innsbruck, Austria; ³The IBDome Consortium, Berlin, Germany

Aigner Elmar, Univ.-Prof. Dr.

LKH Salzburg-Universitätsklinikum d. PMU, Univ.-Klinik für Innere Medizin I mit Gastroenterologie Hepatologie, Nephrologie, Diabetologie und Stoffwechselerkrankungen, Salzburg

Asamer Eva, Dr.

Ordensklinikum Linz – Barmherzige Schwestern,
Interne 4: Gastroenterologie und Hepatologie,
Endokrinologie und Stoffwechsel, Linz

Blesl Andreas, Univ. Priv.-Doz. DDr.

LKH Universitätsklinikum Graz, Univ.-Klinik für Innere Medizin,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie,
Medizinische Universität Graz, Graz

Coti Natascha, DGKP

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Dabsch Stefanie, Priv.-Doz Dr., PhD

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Datz Christian, Prim. Univ.-Prof. Dr.

Krankenhaus Oberndorf, Innere Medizin, Oberndorf bei Salzburg

Dejaco Clemens, ao. Univ.-Prof. Dr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Dinkhauser Patrick, Dr.

Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH, Standort Wels,
Abteilung für Innere Medizin I, Wels

Dolak Werner, Assoc.-Prof. Priv.-Doz. Dr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Ettinger Doris, DGKP

Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH, Standort Wels,
Abteilung für Innere Medizin I, Wels

Fellinghauer Martina, DGKP

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Ferlitsch Arnulf, Prim. Prof. Priv.-Doz. Dr.

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien, Innere Medizin I,
Abteilung für Innere Medizin, Gastroenterologie und Nephrologie, Wien

Ferlitsch Monika, Prim. Univ.-Prof. Dr.

Klinik Floridsdorf, Abteilung für Innere Medizin mit Gastroenterologie und
Akutgeriatrie/Remobilisation, Wien

Fickert Peter, Univ.-Prof. Dr.

LKH Universitätsklinikum Graz, Univ.-Klinik für Innere Medizin,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie,
Medizinische Universität Graz, Graz

Fuchs Elisabeth, Dr., BSc

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien, Innere Medizin I,
Abteilung für Innere Medizin, Gastroenterologie und Nephrologie, Wien

Füssel Lisa-Michaela, Dr.

Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH, Standort Wels,
Abteilung für Innere Medizin II, Wels

Grander Christoph, Dr., PhD

LKH – Universitätskliniken Innsbruck, Department Innere Medizin,
Univ.-Klinik für Innere Medizin I, Innsbruck

Gröchenig Hans-Peter, Prim. Dr.

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder,
Abteilung für Innere Medizin, St. Veit an der Glan

Gschwantler Michael, Prim. Univ.-Prof. Dr.

Klinik Ottakring, 4. Medizinische Abteilung, mit Gastroenterologie,
Hepatologie, Endoskopie, Wien

Häfner Michael, Dr.

Ordination Dr. Michael Häfner, Facharzt für Innere Medizin,
Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Halilbasic Emina, Dr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Hametner-Schreil Stephanie, Dr.

Ordensklinikum Linz – Barmherzige Schwestern, Interne 4:
Gastroenterologie und Hepatologie, Endokrinologie und Stoffwechsel, Linz

Hammer Johann, ao. Univ.-Prof. Dr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Hartl Lukas, Dr. BA

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Haunschildt Johannes, Dr.

Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH, Standort Wels,
Abteilung für Innere Medizin I, Wels

Helfers Jessica, DGKP

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Hofer Harald, Prim. Univ.-Prof. Dr.

Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH, Standort Wels,
Abteilung für Innere Medizin I, Wels

Högenauer Christoph, ao. Univ.-Prof. Dr.

LKH Universitätsklinikum Graz, Univ.-Klinik für Innere Medizin,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie,
Medizinische Universität Graz, Graz

Huber Gerhard W., Prof. Dr., LL.M., PM.ME

Huber & Dietrich Rechtsanwalts-Partnerschaft, Linz

Kazemi-Shirazi Lili, ao. Univ.-Prof. Dr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Kitzberger Vera, Dr.

Kepler Universitätsklinikum, Universitätsklinik für Innere Medizin 2,
Gastroenterologie und Hepatologie, Endokrinologie und Stoffwechsel,
Nephrologie, Rheumatologie, Linz

Koutny Florian, Dr.

Universitätsklinikum St. Pölten, Klinische Abteilung für Innere Medizin 2,
Gastroenterologie und Hepatologie, St. Pölten

Lackner Carolin, Dr.

LKH Universitätsklinikum Graz, Diagnostik & Forschungsinstitut für
Pathologie, Graz

Lampichler Katharina, Dr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin, Wien

Madl Christian, Prim. Univ.-Prof. Dr.

Klinik Landstraße, 4. Medizinische Abteilung mit Zentrum für Gastroenterologische & Hepatologische Erkrankungen, Wien

Mady Samy, Dr.

LKH Universitätsklinikum Graz, Univ.-Klinik für Innere Medizin, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Medizinische Universität Graz, Graz

Maieron Andreas, Prim. Priv.-Doz. Dr.

Universitätsklinikum St. Pölten, , Klinische Abteilung für Innere Medizin 2, Gastroenterologie und Hepatologie, St. Pölten

Mandorfer Mattias, Ap. Prof. Priv.-Doz. DDr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Meierhofer Clara Victoria, Dr.

Ordensklinikum Linz – Barmherzige Schwestern, Interne 4: Gastroenterologie und Hepatologie, Endokrinologie und Stoffwechsel, Linz

Miehsler Wolfgang, Univ.-Doz. Dr.

KH der Barmherzigen Brüder Salzburg, Abteilung für Innere Medizin, Salzburg

Panzer Marlene, Dr.

LKH – Universitätskliniken Innsbruck, Department Innere Medizin, Univ.-Klinik für Innere Medizin I, Innsbruck

Paternostro Rafael, Priv.-Doz. DDr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Peck-Radosavljevic Markus, Prim. Univ.-Prof. Dr., MBA

Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Endokrinologie und Nephrologie, Klagenfurt am Wörthersee

Pimingstorfer Philipp, Dr.

Kepler Universitätsklinikum, Universitätsklinik für Innere Medizin 2, Gastroenterologie und Hepatologie, Endokrinologie und Stoffwechsel, Nephrologie, Rheumatologie, Linz

Pinter Matthias, Ap. Prof. Priv.-Doz. Dr., PhD

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Pomej Katharina, Dr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Prosenz Julian, Dr.

Universitätsklinikum St. Pölten, Klinische Abteilung für Innere Medizin 2, Gastroenterologie und Hepatologie, St. Pölten

Püspök Andreas, Prim. Univ.-Prof. Dr.

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt, Abteilung für Innere Medizin II, Eisenstadt

Reiberger Thomas, Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Reinisch Walter, ao. Univ.-Prof. Dr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Robl Matthias, Dr.

Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH, Standort Wels, Abteilung für Innere Medizin I, Wels

Schäfer Benedikt, Ass. Prof. Priv.-Doz. Dr., PhD

LKH – Universitätskliniken Innsbruck, Department Innere Medizin, Univ.-Klinik für Innere Medizin I, Innsbruck

Scheiner Bernhard, Priv.-Doz. DDr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Scherzer Thomas-Matthias, Univ.-Prof. Dr., MBA

Universitätsklinikum Wiener Neustadt, Klinischen Abteilung für Innere Medizin I – Gastroenterologie und Hepatologie, Wiener Neustadt

Schiefer Katrin, DGKP

Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH, Standort Wels,
Abteilung für Innere Medizin I, Wels

Schlager Hansjörg, Dr.

LKH Universitätsklinikum Graz, Univ.-Klinik für Innere Medizin,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie,
Medizinische Universität Graz, Graz

Schöfl Rainer, Univ.-Prof. Dr.

Ehemals. Ordensklinikum Linz – Barmherzige Schwestern, Interne 4:
Gastroenterologie und Hepatologie, Endokrinologie und Stoffwechsel, Linz

Schöniger-Hekele Maximilian, Univ.-Prof. Dr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Schreiner Philipp, Priv.-Doz. Dr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Schulz Christian, Prof. Dr.

Klinikum der Universität München, Medizinische Klinik I und Poliklinik,
München

Semmler Georg, DDr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Sezer Aylin, Dr.

Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH, Standort Wels,
Abteilung für Innere Medizin I, Wels

Stadlbauer-Köllner Vanessa, Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr.

LKH Universitätsklinikum Graz, Univ.-Klinik für Innere Medizin,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie,
Medizinische Universität Graz, Graz

Steidl Karin, Dr.

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Abteilung für Innere Medizin,
St. Veit an der Glan

Steiner Pius, Dr.

Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH, Standort Wels,
Abteilung für Innere Medizin I, Wels

Tatscher Elisabeth, Univ.-Priv. Doz. DDR.

LKH Universitätsklinikum Graz, Univ.-Klinik für Innere Medizin,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie,
Medizinische Universität Graz, Graz

Tilg Herbert, Univ.-Prof. Dr.

LKH – Universitätskliniken Innsbruck, Department Innere Medizin,
Univ.-Klinik für Innere Medizin I, Innsbruck

Trauner Michael, Univ.-Prof. Dr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Tribl Barbara, Univ.-Prof. Dr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Wernly Bernhard, Ap. Univ.-Prof. Dr. MSc PH, PhD

LKH Salzburg-Universitätsklinikum d. PMU, Univ.-Klinik für
Innere Medizin II mit Kardiologie, Salzburg

Zaininger Agnes,

Kepler Universitätsklinikum, Med Campus III, Endoskopie Zentrum, Linz

Zessner-Spitzenberg Jasmin, Dr.

Medizinische Universität Wien/AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Medizin III,
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Wien

Ziachehabi Alexander, Prim. Dr.

Ordensklinikum Linz – Barmherzige Schwestern,
Interne 4: Gastroenterologie und Hepatologie,
Endokrinologie und Stoffwechsel, Linz

Freitag, 13. Juni 2025

Programm:

- 08.15 – 08.30 **Begrüßung**
- 08.30 – 09.15 Arbeitsschutz geht uns alle an
*Ing. Christian Artner, Stabstelle Sicherheitstechnik
Klinik Landstraße (Wien)*
- 09.15 – 10.10 Fit für die Arbeit,
wie erreiche ich unbeschadet die Pension?
*Thomas Graf, MAS, Institut für Physikalische Medizin und
Rehabilitation, Klinik Landstraße (Wien)*
- 10.10 – 10.30 **Pause**
- 10.30 – 12.30 Rendezvous: Pflege und Medizintechnik Hand-in-Hand
- 12.30 – 14.00 **Pause**
- 14.00 – 15.45 **Gemeinsame Sitzung mit ÖGGH**
siehe ÖGGH Jahrestagung Programm
- ÖGGH-Positionspapier:
Sedierung bei gastrointestinalen Endoskopien
Christian Madl (Wien)
 - Endoskopischer Verschluss nach EMR, ESD: Wann? Wie?
Werner Dolak (Wien)
 - Endoskopie 2030
aus Sicht des Endoskopikers & aus Sicht der
Endoskopie Assistenz
*Andreas Püspök (Eisenstadt)
Martina Fellinghauer (Wien)*
- 15.45 – 16.00 **Pause**
- 16.00 – 16.45 OTA, DGKP, BSc, MSc – Interprofessionelle Zusammenarbeit
in der Endoskopie
*Natascha Coti, DGKP, Endoskopie, Innere Medizin 3,
AKH Wien (Wien)*
- 16.50 – 17.00 Was gibt es Neues
- 17.05 – 17.25 IVEPA e.V. Jahreshauptversammlung

Wir bedanken uns bei den Sponsoren der 31. IVEPA Jahrestagung

Fachkurzinformation zu Seite 4

Bezeichnung des Arzneimittels: KEYTRUDA 25 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung. **Qualitative und Quantitative Zusammensetzung:** Eine Durchstechflasche mit 4 ml Konzentrat enthält 100 mg Pembrolizumab. Jeder ml des Konzentrats enthält 25 mg Pembrolizumab. Pembrolizumab ist ein humanisierter monoklonaler „anti-programmable cell death-1“ (PD-1)-Antikörper (IgG4/Kappa-Isotyp mit einer stabilisierenden Sequenzänderung in der Fc-Region), welcher mittels rekombinanter DNA-Technologie in Chinesischen-Hamster-Ovarialzellen („CHO-Zellen“) hergestellt wird. **Liste der sonstigen Bestandteile:** L-Histidin, L-Histidinhydrochlorid-Monohydrat, Saccharose, Polysorbat 80 (E 433), Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** **Melanom:** KEYTRUDA ist als Monotherapie zur Behandlung des fortgeschrittenen (nicht resezierbaren oder metastasierenden) Melanoms bei Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren und Erwachsenen angezeigt. KEYTRUDA ist als Monotherapie zur adjuvanten Behandlung des Melanoms in den Tumorstadien IIB, IIC oder III nach vollständiger Resektion bei Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren und Erwachsenen angezeigt. **Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (non-small cell lung carcinoma, NSCLC):** KEYTRUDA ist in Kombination mit Platin-basierter Chemotherapie zur neoadjuvanten und anschließend als Monotherapie zur adjuvanten Behandlung des resezierbaren nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms bei Erwachsenen angezeigt. KEYTRUDA ist als Monotherapie zur adjuvanten Behandlung des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms mit hohem Rezidivrisiko nach vollständiger Resektion und Platin-basierter Chemotherapie bei Erwachsenen angezeigt. KEYTRUDA ist als Monotherapie zur Erstlinienbehandlung des metastasierenden nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms mit PD-L1-exprimierenden Tumoren (Tumor Proportion Score [TPS] $\geq 50\%$) ohne EGFR- oder ALK-positive Tumormutationen bei Erwachsenen angezeigt. KEYTRUDA ist in Kombination mit Pemetrexed und Platin-Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung des metastasierenden nicht-plattenepithelialen nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms ohne EGFR- oder ALK-positive Tumormutationen bei Erwachsenen angezeigt. KEYTRUDA ist in Kombination mit Carboplatin und entweder Paclitaxel oder nab-Paclitaxel zur Erstlinienbehandlung des metastasierenden plattenepithelialen nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms bei Erwachsenen angezeigt. KEYTRUDA ist als Monotherapie zur Behandlung des lokal fortgeschrittenen oder metastasierenden nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms mit PD-L1-exprimierenden Tumoren (TPS $\geq 1\%$) nach vorheriger Chemotherapie bei Erwachsenen angezeigt. Patienten mit EGFR- oder ALK-positiven Tumormutationen sollten vor der Therapie mit KEYTRUDA ebenfalls eine auf diese Mutationen zielgerichtete Therapie erhalten haben. **Malignes Pleuramesotheliom (Malignant pleural mesothelioma, MPM):** KEYTRUDA ist in Kombination mit Pemetrexed und Platin-Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung des nicht resezierbaren nicht-epitheloiden malignen Pleuramesothelioms bei Erwachsenen angezeigt. **Klassisches Hodgkin-Lymphom (HL):** KEYTRUDA ist als Monotherapie zur Behandlung des rezidivierenden oder refraktären klassischen Hodgkin-Lymphoms bei Kindern und Jugendlichen ab 3 Jahren und Erwachsenen nach Versagen einer autologen Stammzelltransplantation (auto-SZT) oder nach mindestens zwei vorangegangenen Therapien, wenn eine auto-SZT nicht in Frage kommt, angezeigt. **Urothelkarzinom:** KEYTRUDA ist in Kombination mit Enfortumab vedotin zur Erstlinienbehandlung des nicht resezierbaren oder metastasierenden Urothelkarzinoms bei Erwachsenen angezeigt. KEYTRUDA ist als Monotherapie zur Behandlung des lokal fortgeschrittenen oder metastasierenden Urothelkarzinoms nach vorheriger Platin-basierter Therapie bei Erwachsenen angezeigt. KEYTRUDA ist als Monotherapie zur Behandlung des lokal fortgeschrittenen oder metastasierenden Urothelkarzinoms bei Erwachsenen, die nicht für eine Cisplatin-basierte Therapie geeignet sind und deren Tumoren PD-L1 mit einem kombinierten positiven Score (CPS) ≥ 10 exprimieren, angezeigt. **Plattenepithelkarzinom der Kopf-Hals-Region (head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC):** KEYTRUDA ist als Monotherapie oder in Kombination mit Platin- und 5-Fluorouracil (5-FU)-Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung des metastasierenden oder nicht resezierbaren rezidivierenden Plattenepithelkarzinoms der Kopf-Hals-Region bei Erwachsenen mit PD-L1-exprimierenden Tumoren (Combined Positive Score [CPS] ≥ 1) angezeigt. KEYTRUDA ist als Monotherapie zur Behandlung des rezidivierenden oder metastasierenden Plattenepithelkarzinoms der Kopf-Hals-Region mit PD-L1-exprimierenden Tumoren (TPS $\geq 50\%$) und einem Fortschreiten der Krebserkrankung während oder nach vorheriger Platin-basierter Therapie bei Erwachsenen angezeigt. **Nierenzellkarzinom (renal cell carcinoma, RCC):** KEYTRUDA ist in Kombination mit Axitinib zur Erstlinienbehandlung des fortgeschrittenen Nierenzellkarzinoms bei Erwachsenen angezeigt. KEYTRUDA ist in Kombination mit Lenvatinib zur Erstlinienbehandlung des fortgeschrittenen Nierenzellkarzinoms bei Erwachsenen angezeigt. KEYTRUDA ist als Monotherapie zur adjuvanten Behandlung des Nierenzellkarzinoms mit erhöhtem Rezidivrisiko nach Nephrektomie oder nach Nephrektomie und Resektion metastasierter Läsionen bei Erwachsenen angezeigt. **Tumoren mit hochfrequenter Mikrosatelliten-Instabilität (MSI-H) oder mit einer Mismatch-Reparatur-Defizienz (dMMR):** **Kolorektalkarzinom (colorectal cancer, CRC):** KEYTRUDA ist als Monotherapie des Kolorektalkarzinoms mit MSI-H oder mit einer dMMR wie folgt bei Erwachsenen angezeigt: - zur Erstlinienbehandlung des metastasierenden Kolorektalkarzinoms. - zur Behandlung des nicht resezierbaren oder metastasierenden Kolorektalkarzinoms nach vorheriger Fluoropyrimidin-basierter Kombinationstherapie. **Nicht-kolorektale Karzinome:** KEYTRUDA ist als Monotherapie zur Behandlung der folgenden Tumoren mit MSI-H oder mit einer dMMR bei Erwachsenen angezeigt: - fortgeschrittenes oder rezidivierendes Endometriumkarzinom mit einem Fortschreiten der Erkrankung während oder nach vorheriger Platin-basierter Therapie in jedem Krankheitsstadium, wenn eine kurative chirurgische Behandlung oder Bestrahlung nicht in Frage kommt. - nicht resezierbares oder metastasierendes Magen-, Dünndarm- oder biläres Karzinom mit einem Fortschreiten der Erkrankung während oder nach mindestens einer vorherigen Therapie. **Ösophaguskarzinom:** KEYTRUDA ist in Kombination mit einer Platin- und Fluoropyrimidin-basierter Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung des lokal fortgeschrittenen nicht resezierbaren oder metastasierenden Ösophaguskarzinoms bei Erwachsenen mit PD-L1-exprimierenden Tumoren (CPS ≥ 10) angezeigt. **Triple-negatives Mammakarzinom (triple-negative breast cancer, TNBC):** KEYTRUDA ist in Kombination mit Chemotherapie zur neoadjuvanten und anschließend nach Operation als Monotherapie zur adjuvanten Behandlung des lokal fortgeschrittenen oder frühen triple-negativen Mammakarzinoms mit hohem Rezidivrisiko bei Erwachsenen angezeigt. KEYTRUDA ist in Kombination mit Chemotherapie zur Behandlung des lokal rezidivierenden nicht resezierbaren oder metastasierenden triple-negativen Mammakarzinoms mit PD-L1-exprimierenden Tumoren (Combined Positive Score [CPS] ≥ 10) bei Erwachsenen, die keine vorherige Chemotherapie zur Behandlung der metastasierenden Erkrankung erhalten haben. **Endometriumkarzinom (endometrial carcinoma, EC):** KEYTRUDA ist in Kombination mit Carboplatin und Paclitaxel zur Erstlinienbehandlung des primär fortgeschrittenen oder rezidivierenden Endometriumkarzinoms bei Erwachsenen, die für eine systemische Therapie geeignet sind, angezeigt. KEYTRUDA ist in Kombination mit Lenvatinib zur Behandlung des fortgeschrittenen oder rezidivierenden Endometriumkarzinoms bei Erwachsenen mit einem Fortschreiten der Erkrankung während oder nach vorheriger Platin-basierter Therapie in jedem Krankheitsstadium, wenn eine kurative chirurgische Behandlung oder Bestrahlung nicht in Frage kommt, angezeigt. **Zervixkarzinom:** KEYTRUDA ist in Kombination mit Radiochemotherapie (perkutane Strahlentherapie, gefolgt von einer Brachytherapie) zur Behandlung des lokal fortgeschrittenen Zervixkarzinoms (Stadium III bis IVA gemäß FIGO 2014) bei Erwachsenen, die keine vorherige definitive Therapie erhalten haben, angezeigt. KEYTRUDA ist in Kombination mit Chemotherapie mit oder ohne

Bevacizumab zur Behandlung des persistierenden, rezidivierenden oder metastasierenden Zervixkarzinoms mit PD-L1-exprimierendem Tumoren (CPS ≥ 1) bei Erwachsenen angezeigt. **Adenokarzinom des Magens oder des gastroösophagealen Übergangs (gastro-oesophageal junction, GEJ):** KEYTRUDA ist in Kombination mit Trastuzumab sowie einer Fluoropyrimidin- und Platin-basierenden Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung des lokal fortgeschrittenen, nicht resezierbaren oder metastasierenden HER2-positiven Adenokarzinoms des Magens oder des gastroösophagealen Übergangs bei Erwachsenen mit PD-L1-exprimierendem Tumoren (CPS ≥ 1) angezeigt. KEYTRUDA ist in Kombination mit einer Fluoropyrimidin- und Platin-basierenden Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung des lokal fortgeschrittenen nicht resezierbaren oder metastasierenden HER2-negativen Adenokarzinoms des Magens oder des gastroösophagealen Übergangs bei Erwachsenen mit PD-L1-exprimierendem Tumoren (CPS ≥ 1) angezeigt. **Biliäres Karzinom (biliary tract carcinoma, BTC):** KEYTRUDA ist in Kombination mit Gemcitabin und Cisplatin zur Erstlinienbehandlung des lokal fortgeschrittenen nicht resezierbaren oder metastasierenden biliären Karzinoms bei Erwachsenen angezeigt. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile. **Ausgewählte besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Bitte beachten Sie die vollständigen Angaben in der aktuellen Fachinformation zu: Rückverfolgbarkeit, Bestimmung des PD-L1-Status, immunvermittelte Nebenwirkungen, immunvermittelte Pneumonitis, immunvermittelte Kolitis, immunvermittelte Hepatitis, immunvermittelte Nephritis, immunvermittelte Endokrinopathien, immunvermittelte Nebenwirkungen an der Haut, andere immunvermittelte Nebenwirkungen, Nebenwirkungen in Verbindung mit einer Organtransplantation, Reaktionen im Zusammenhang mit einer Infusion, Anwendung von Pembrolizumab in Kombination mit Chemotherapie, erkrankungsspezifische Vorsichtsmaßnahmen, von klinischen Studien ausgeschlossene Patienten und Patientenkarte. **Ausgewählte Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen:** Da Pembrolizumab durch katabolischen Abbau aus dem Blutkreislauf eliminiert wird, sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln zu erwarten. Eine systemische Anwendung von Kortikosteroiden oder Immunsuppressiva vor Therapiebeginn mit Pembrolizumab sollte vermieden werden. Bitte beachten Sie die vollständigen Angaben in der aktuellen Fachinformation. **Ausgewählte Nebenwirkungen:** Sehr häufige Nebenwirkungen ($\geq 1/10$) unter Pembrolizumab als Monotherapie: Anämie, Hypothyreose, verminderter Appetit, Kopfschmerzen, Dyspnoe, Husten, Diarrhö, Abdominalschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Obstipation, Ausschlag, Pruritus, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Arthralgie, Ermüdung/Fatigue, Asthenie, Ödeme und Fieber. Sehr häufige Nebenwirkungen ($\geq 1/10$) unter Pembrolizumab in Kombination mit Chemotherapie oder Radiochemotherapie: Neutropenie, Anämie, Thrombozytopenie, Hypothyreose, Hypokaliämie, verminderter Appetit, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, periphere Neuropathie, Schwindelgefühl, Dyspnoe, Husten, Diarrhö, Übelkeit, Erbrechen, Obstipation, Abdominalschmerzen, Ausschlag, Alopezie, Pruritus, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Arthralgie, Ermüdung/Fatigue, Asthenie, Fieber, Ödeme, Alaninaminotransferase (ALT) erhöht, Aspartataminotransferase (AST) erhöht. Sehr häufige Nebenwirkungen ($\geq 1/10$) unter Pembrolizumab in Kombination mit Axitinib oder Lenvatinib: Harnwegsinfektionen, Anämie, Hypothyreose, verminderter Appetit, Kopfschmerzen, Dysgeusie, Hypertonie, Dyspnoe, Husten, Diarrhö, Abdominalschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Obstipation, Ausschlag, Pruritus, Arthralgie, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Myositis, Schmerzen in den Extremitäten, Ermüdung/Fatigue, Asthenie, Ödeme, Fieber, Lipase erhöht, ALT-/AST erhöht, Kreatinin im Blut erhöht. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Antineoplastische Mittel, PD-1/PDL-1 (Programmed Cell Death-1-Rezeptor/Programmed Cell Death-1-Ligand-1)-Inhibitoren. ATC-Code: L01FF02. **Inhaber der Zulassung:** Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Niederlande. **Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. **Stand der Information:** April 2025. Weitere Angaben zu Dosierung und Art der Anwendung, Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen, Nebenwirkungen, Überdosierung, Pharmakologische Eigenschaften und Pharmazeutische Angaben sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.

Fachkurzinformation zu Seite 15

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8 der Fachinformation.

VELSIPITY® 2 mg Filmtabletten: **Qualitative und quantitative Zusammensetzung:** Jede Filmtablette enthält Etrasimod-Arginin, entsprechend 2 mg Etrasimod. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Jede Filmtablette enthält 0,0156 mg des Farbstoffs Tartrazin (E102). **Liste der sonstigen Bestandteile:** Tablettenkern: Magnesiumstearat (E470b), Mannitol (E421), Mikrokristalline Cellulose (E460i), Natriumstärkeglykolat (Typ A). Filmüberzug: Brillantblau-FCF-Aluminiumsulfid (E133), Indigocarmin-Aluminiumsulfid (E132), Tartrazin-Aluminiumsulfid (E102), Macrogol 4000 (E1521), Poly(vinylalkohol) (E1203), Talkum (E553b), Titandioxid (E171). **Anwendungsgebiete:** Velsipity wird angewendet für die Behandlung von Patienten ab 16 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer aktiver Colitis ulcerosa (CU), die auf eine konventionelle Therapie oder ein Biologikum unzureichend oder gar nicht angesprochen haben oder diese nicht vertragen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 der Fachinformation genannten sonstigen Bestandteile. Immunschwäche (siehe Abschnitt 4.4 der Fachinformation). Patienten, die in den letzten 6 Monaten einen Myokardinfarkt, eine instabile Angina pectoris, einen Schlaganfall, eine transitorische ischämische Attacke (TIA), eine dekompensierte Herzinsuffizienz mit stationärer Behandlung oder eine Herzinsuffizienz der Klasse III/IV gemäß der New York Heart Association (NYHA) erlitten haben. Patienten mit Anamnese oder Vorliegen eines atrioventrikulären (AV) Blocks zweiten Grades Mobitz-Typ II oder dritten Grades, eines Sick-Sinus-Syndroms oder eines sino-atrialen Blocks. Ausgenommen davon sind Patienten mit einem funktionierenden Herzschrittmacher. Schwere aktive Infektionen, aktive chronische Infektionen wie Hepatitis oder Tuberkulose (siehe Abschnitt 4.4 der Fachinformation). Aktive Malignome. Schwere Leberfunktionseinschränkung. Während der Schwangerschaft und bei Frauen im gebärfähigen Alter, die keine wirksame Empfängnisverhütung anwenden (siehe Abschnitte 4.4 und 4.6 der Fachinformation). **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Immunsuppressiva, Sphingosin-1-Phosphat(S1P)-Rezeptor-Modulatoren, Etrasimod, ATC-Code: L04AE05. **Inhaber der Zulassung:** Pfizer Europe MA EEIC, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brüssel, Belgien. **Stand der Information:** Juni 2024. **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig. **Angaben zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.**

Fachkurzinformation zu Seite 11

Dupixent 300 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze Dupixent 300 mg Injektionslösung im Fertigpen Dupixent 200 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze Dupixent 200 mg Injektionslösung im Fertigpen

Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Fertigspritze zur einmaligen Anwendung enthält 300 mg Dupilumab in 2 ml Lösung (150 mg/ml). Jede Fertigspritze zur einmaligen Anwendung enthält 200 mg Dupilumab in 1,14 ml Lösung (175 mg/ml). Jeder Fertigpen zur einmaligen Anwendung enthält 300 mg Dupilumab in 2 ml Lösung (150 mg/ml). Jeder Fertigpen zur einmaligen Anwendung enthält 200 mg Dupilumab in 1,14 ml Lösung (175 mg/ml). Dupilumab ist ein vollständig humaner monoklonaler Antikörper. Er wird mittels rekombinanter DNA-Technologie in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (Chinesische Hamster Ovary, CHO) produziert. **Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung:** Dieses Arzneimittel enthält 4 mg Polysorbat 80 pro 300-mg-Dosis (2 ml). Polysorbate können allergische Reaktionen hervorrufen. **Liste der sonstigen Bestandteile:** Argininhydrochlorid, Histidin, Histidinhydrochlorid-Monohydrat, Polysorbat 80 (E 433), Natriumacetat-Trihydrat, Essigsäure 99 % (E 260), Saccharose, Wasser für Injektionszwecke. • **Anwendungsgebiete:** **Atopische Dermatitis Erwachsene und Jugendliche:** Dupixent wird angewendet zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis (AD) bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren, die für eine systemische Therapie in Betracht kommen. **Kinder von 6 Monaten bis 11 Jahre:** Dupixent wird angewendet zur Behandlung von schwerer atopischer Dermatitis bei Kindern von 6 Monaten bis 11 Jahre, die für eine systemische Therapie in Betracht kommen. **Asthma Erwachsene und Jugendliche:** Dupixent ist angezeigt als Add-on-Erhaltungstherapie bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren mit schwerem Asthma mit Typ-2-Entzündung, gekennzeichnet durch eine erhöhte Anzahl der Eosinophilen im Blut und/oder eine erhöhte exhalierete Stickstoffmonoxid-Fraktion (FeNO), siehe Abschnitt 5.1, das trotz hochdosierter inhalativer Kortikosteroide (ICS) plus einem weiteren zur Erhaltungstherapie angewendeten Arzneimittel unzureichend kontrolliert ist. **Kinder von 6 bis 11 Jahre:** Dupixent ist angezeigt als Add-on- Erhaltungstherapie bei Kindern von 6 bis 11 Jahre mit schwerem Asthma mit Typ-2- Entzündung, gekennzeichnet durch eine erhöhte Anzahl der Eosinophilen im Blut und/oder eine erhöhte exhalierete Stickstoffmonoxid-Fraktion (FeNO), siehe Abschnitt 5.1, das trotz mittel- bis hochdosierter inhalativer Kortikosteroide (ICS) plus einem weiteren zur Erhaltungstherapie angewendeten Arzneimittel unzureichend kontrolliert ist. **zusätzlich 300 mg: Chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (Chronic rhinosinusitis with nasal polyposis, CRSwNP)** Dupixent ist angezeigt als Add-on-Therapie mit intranasalen Kortikosteroiden zur Behandlung von Erwachsenen mit schwerer CRSwNP, die mit systemischen Kortikosteroiden und/oder chirurgischem Eingriff nicht ausreichend kontrolliert werden kann. Prurigo nodularis (PN) Dupixent ist angezeigt zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Prurigo nodularis (PN) bei Erwachsenen, die für eine systemische Therapie in Betracht kommen. **Eosinophile Ösophagitis (EoE)** Dupixent ist angezeigt zur Behandlung der eosinophilen Ösophagitis bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 1 Jahr mit einem Körpergewicht von mindestens 15 kg, die mit einer konventionellen medikamentösen Therapie unzureichend therapiert sind, diese nicht vertragen oder für die eine solche Therapie nicht in Betracht kommt (siehe Abschnitt 5.1). **Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (Chronic obstructive pulmonary disease, COPD)** Dupixent ist angezeigt als Add-on-Erhaltungstherapie bei erwachsenen Patienten mit durch eine erhöhte Anzahl an Eosinophilen im Blut gekennzeichnete chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), die trotz einer Kombinationstherapie aus einem inhalativen Corticosteroid (ICS), einem langwirksamen Beta-2-Agonisten (LABA) und einem langwirksamen Muskarinantagonisten (LAMA) oder, falls ICS nicht angebracht ist, einer Kombinationstherapie aus LABA und LAMA unzureichend kontrolliert ist (siehe Abschnitt 5.1). • **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. • **Zulassungsinhaber:** Sanofi Winthrop Industrie, 82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, Frankreich. • **Abgabe:** Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. • **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Andere Dermatika, Mittel zur Behandlung der Dermatitis, exkl. Kortikosteroide, ATC-Code: D11AH05. **Stand der Information:** November 2024.

Weitere Angaben zu den besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen sowie ggf. Gewöhnungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.

ÖGGH
20WELS25